

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Flubenol KH ad us. vet. 44 mg/ml pasta per uso orale per cani e gatti

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Elanco Tiergesundheit AG

Mattenstrasse 24A

4058 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Lusomedicamenta Sociedad Tecnica Farmaceutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, n.o 66, 69-B

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugal

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Flubenol KH ad us. vet. 44 mg/ml pasta per uso orale per cani e gatti

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 ml di pasta contiene:

Principio attivo:

Flubendazolo 44 mg

Altri ingredienti:

P-idrossibenzoato di metile (E 218) 1,8 mg

P-idrossibenzoato di propile 0,2 mg

Pasta per uso orale di colore da bianco a crema.

4 INDICAZIONE(I)

Cani, gatti: Infestazioni da ascaridi, anchilostomi, tricocefali e alcuni cestodi (*Taenia pisiformis*).

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare contro *Dipylidium caninum* ed echinococchi.

6 EFFETTI COLLATERALI

Talvolta Flubenol KH pasta può causare salivazione nei gatti. Si tratta di un fenomeno di breve durata e non ha alcun effetto sul trattamento di sverminazione né sulla salute generale del gatto.

Non sono noti effetti collaterali nel cane.

Se nell'animale trattato si manifestano effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE


Gatto, cane.

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.

0,5 ml di pasta per kg di peso corporeo (PC).

1. Cani e gatti con infezioni da ascaridi e anchilostomi: somministrare 1 tacca per 1 kg PC per via orale 1 volta al giorno per **due** giorni consecutivi.
2. Cani e gatti con infezioni da altri tipi di vermi: somministrare 1 tacca per 1 kg PC per via orale 1 volta al giorno per **tre** giorni consecutivi.
3. Oltre alla sverminazione di routine (cfr. schema di trattamento), il trattamento di cani e gatti adulti è sempre indicato anche dopo un esame parassitologico delle feci con esito positivo.



Afferrare il pistone (1) all'estremità posteriore con una mano, portare la ghiera (2) sullo 0 con l'altra mano. Rimuovere il cappuccio (3) e premere il pistone portandolo a 0. Quindi, ruotare la ghiera fino alla tacca corrispondente al peso corporeo dell'animale. Per somministrare la pasta, premere il pistone. La ghiera consente di erogare la quantità esatta.

Per il 2° e l'eventuale 3° trattamento, risommare il peso dell'animale, ruotare di nuovo la ghiera e premere il pistone.

Esempio: per un gatto di 5 kg, impostare la ghiera su 5 kg per il primo trattamento, 10 kg per il secondo e 15 kg per il terzo.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

La pasta può essere somministrata:

- applicando la dose esatta direttamente nella bocca dell'animale;
- miscelando la dose esatta nel cibo (consigliato per animali recalcitranti);
- nei gatti, spalmando la pasta su una zampa anteriore per essere leccata.

Schema di trattamento

Il trattamento deve essere effettuato solo dopo aver consultato la veterinaria/il veterinario.

Se il rischio per il singolo cane o gatto non può essere chiaramente valutato, negli animali adulti si dovrebbero effettuare un esame delle feci o la sverminazione almeno quattro volte l'anno.

Cuccioli di cane:

Sverminare ogni 14 giorni a partire dalle 2 settimane di età, fino a 2 settimane dopo lo svezzamento, quindi trattamenti mensili fino ai sei mesi.

Cagne:

Sverminare durante il calore e 10 giorni prima e dopo il parto. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio della veterinaria/del veterinario curante.

Cuccioli di gatto:

Sverminare ogni 2 settimane dalle 3 settimane di età fino allo svezzamento, quindi trattamenti mensili fino ai 6 mesi.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla scatola con la dicitura EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Può svilupparsi una resistenza dei parassiti a una particolare classe di antelmintici a seguito della somministrazione frequente e ripetuta di un antelmintico di quella classe.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Evitare il più possibile il contatto diretto con la pelle.

Non fumare, mangiare o bere quando si manipola il medicinale veterinario.

Lavare le mani dopo l'uso.

Gravidanza e allattamento:

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio della veterinaria/del veterinario curante.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

07.02.2023

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

7,5 ml di pasta in una siringa per somministrazione orale in plastica in una scatola pieghevole.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 49738

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.