

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.swissmedicinfo-pro.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Frontline Combo® Spot-on Chien S ad us. vet., solution spot-on

Frontline Combo® Spot-on Chien M ad us. vet., solution spot-on

Frontline Combo® Spot-on Chien L ad us. vet., solution spot-on

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH,
Hochbergerstrasse 60 B, 4057 Bâle

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Frontline Combo® Spot-on Chien S ad us. vet., solution spot-on

Frontline Combo® Spot-on Chien M ad us. vet., solution spot-on

Frontline Combo® Spot-on Chien L ad us. vet., solution spot-on

LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Une pipette contient :

Substances actives :

Frontline Combo Spot-on Chien	Volume de la dose unique	Teneur en fipronil	Teneur en (S)-méthoprène
S	0.67 ml	67.0 mg	60.3 mg
M	1.34 ml	134.0 mg	120.6 mg
L	2.68 ml	268.0 mg	241.2 mg

Excipients :

Butylhydroxyanisole (E320) 0.2 mg

Butylhydroxytoluène (E321) 0.1 mg

Solution pour application topique cutanée.

Solution claire ambrée.

INDICATION(S)

Chez les chiens et chiots (âge minimum 8 semaines; poids minimum 2 kg) :

- Contre les infestations par les puces, les tiques et/ou les poux.



- Elimination des puces. L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines.
- Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs, des larves et nymphes issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application.
- Elimination des tiques. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines.
- Elimination des poux broyeurs
- Le traitement et contrôle de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP).

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple fièvre) ou convalescents.

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots âgés de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Des études n'étant pas disponibles, l'utilisation de ce produit chez des espèces autres que le chien n'est pas recommandée.

La taille de la pipette a été développée spécialement pour les chiens. Ne pas utiliser chez le chat et le furet car cela peut conduire à un surdosage.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un principe actif ou à un autre composant (par exemple insecticides ou alcool).

EFFETS INDÉSIRABLES

En cas de léchage, une brève période de forte salivation principalement due à la nature de l'excipient peut être observée.

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, perte locale de poils, démangeaisons, rougeur de la peau) ainsi que des démangeaisons générales ou une perte générale de poils ont été rapportées.

Une forte salivation, des réactions neurologiques passagères (hypersensibilité, abattement, autres symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été également observés après utilisation.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens



BOSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Application topique cutanée.

- 1 pipette de 0.67 ml pour un chien pesant de 2 à 10 kg.
- 1 pipette de 1.34 ml pour un chien pesant plus de 10 jusqu' à 20 kg.
- 1 pipette de 2.68 ml pour un chien pesant plus de 20 jusqu'à 40 kg.

permettant de délivrer la dose minimale recommandée de 6.7 mg/kg de fipronil et 6 mg/kg de (S)-méthoprène.

Pour les chiens de plus de 40 kg, utiliser l'association appropriée de deux tailles de pipettes permettant de s'approcher le plus possible du poids corporel.

En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Tenir la pipette droite. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que son contenu reste dans la partie large de la pipette. Casser l'embout d'un geste sec en direction du dos de la pipette. Ecarter les poils au niveau du dos de l'animal, à la base de la nuque entre les omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et presser la pipette plusieurs fois afin de vider totalement son contenu sur la peau en un point.

TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte

MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Éviter le contact avec les yeux de l'animal.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Il est important de veiller à appliquer le produit sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux.

Les bains/immersions dans l'eau dans les 2 jours suivant l'application du produit et des bains plus fréquents qu'une fois par semaine doivent être évités en l'absence d'étude d'efficacité à ce sujet. Les shampoings émoullissants peuvent être utilisés avant le traitement, mais diminuent la durée de protection contre les puces à environ 5 semaines lorsqu'ils sont utilisés une fois par semaine après application du produit. Les bains hebdomadaires avec des shampoings à 2 % de chlorhexidine n'ont pas diminué l'efficacité du produit contre les puces dans une étude de 6 semaines. Les chiens ne doivent pas être autorisés à nager dans les cours d'eau pendant les 2 jours suivant l'application.



Des tiques peuvent occasionnellement être observées aussi chez les animaux traités. Pour cette raison, la transmission des maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.

Les puces des animaux de compagnie infestent souvent leur panier, leur zone de couchage et leurs zones de repos habituelles comme les tapis et les canapés. Surtout en cas d'infestation massive et en début de traitement, ces endroits devront être traités avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Eviter le contact avec les doigts. Si cela se produisait, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition accidentelle avec les yeux rincer à l'eau pure avec soin.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée.

Les animaux récemment traités ne doivent pas dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Gestation et lactation :

Peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

Aucune connue.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Ne pas surdoser. Aucun effet indésirable n'a été mis en évidence dans les études de tolérance chez les chiots de 8 semaines, les chiens en croissance et les chiens d'environ 2 kg traités une fois à 5 fois la dose recommandée. Le risque de provoquer des effets secondaires peut cependant augmenter avec le surdosage. Il est donc recommandé de toujours traiter les animaux avec la taille de pipette appropriée.

Incompatibilités :

Aucune connue.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Frontline Combo ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin.

Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

15.08.2025

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses

www.swissmedic.ch et www.swissmedicininfo-pro.ch.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîte de 3 pipettes (1 blister de 3 pipettes) de 0.67 ml de solution

Boîte de 3 pipettes (1 blister de 3 pipettes) de 1.34 ml de solution

Boîte de 3 pipettes (1 blister de 3 pipettes) de 2.68 ml de solution

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 56045

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.

