INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Baycox 5% ad us. vet., sospensione orale per vitelli, suinetti, agnelli e conigli

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Elanco Tiergesundheit AG

Mattenstrasse 24A

4058 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma – und Veterinär-Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D- 24106 Kiel

Germania

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Baycox 5% ad us. vet., sospensione orale per vitelli, suinetti, agnelli e conigli

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 ml di sospensione contiene:

Principio attivo:

Toltrazuril 50 mg

Eccipienti:

Sodio benzoato (E 211) 2,1 mg

Sodio propionato (E 281) 2,1 mg

Sospensione per somministrazione orale

Sospensione bianca o giallastra

4 INDICAZIONE(I)

Vitelli:

Per impedire l'ulteriore diffusione della coccidiosi e per ridurre la proliferazione degli stadi infettivi dei parassiti nei vitelli fino all'età di 9 mesi in aziende con una problematica accertata di coccidiosi.

Suinetti:

Per la prevenzione e la terapia della coccidiosi nei suinetti nella prima settimana di vita in allevamenti infestati.

Agnelli:

Per prevenire e impedire l'ulteriore diffusione della coccidiosi negli agnelli.

Conigli:

Per la terapia e la prevenzione della coccidiosi nei conigli.

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o a un eccipiente.

6 EFFETTI COLLATERALI

Nessuno conosciuto.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Vitelli, suinetti, agnelli e conigli

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Vitelli:

Fino all'età di 9 mesi dopo lo stallaggio in un ambiente contaminato da coccidi, 2 settimane dopo l'infezione e quindi circa 1 settimana prima dell'insorgenza della malattia, un unico trattamento per impedire l'ulteriore diffusione della coccidiosi: 15 mg di toltrazuril per kg di peso corporeo. Ciò corrisponde a 3 ml di Baycox™ 5% sospensione orale per 10 kg di peso corporeo.

Suinetti:

Nella prima settimana di vita 20 mg di toltrazuril per kg di peso corporeo; ogni volta che viene utilizzato, l'applicatore orale in dotazione eroga la dose (0,7 ml) per 2 kg di peso corporeo. Un solo trattamento è sufficiente.

Agnelli:

Trattamento per impedire l'ulteriore diffusione della coccidiosi: 7 - 10 giorni dopo il pascolo, il cambiamento di pascolo, lo stallaggio o il trasferimento in un ambiente contaminato da coccidi, una

volta 20 mg di toltrazuril per kg di peso corporeo. Ciò corrisponde a 0,4 ml di Baycox™ 5% per kg di peso corporeo.

Conigli:

In caso di segni riconoscibili di una coccidiosi o per il trattamento preventivo dopo lo svezzamento: 15 mg di toltrazuril per kg di peso corporeo una volta per uso orale. Ciò corrisponde a 0,3 ml di Baycox™ 5% sospensione orale per kg di peso corporeo.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Agitare la sospensione prima dell'uso. Per assicurare la somministrazione di una dose corretta, il peso corporeo dell'animale deve essere calcolato il più accuratamente possibile.

Misure profilattiche essenziali: buoni valori climatici della stalla ed eliminazione delle fonti di infezione con il mantenimento di un ambiente asciutto e pulito.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Tessuti edibili:	Vitelli:	63 giorni
	Suinetti:	70 giorni
	Agnelli:	42 giorni
	Conigli:	35 giorni

Non usare in bovini e ovini in allattamento, il cui latte sia destinato al consumo umano.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservazione: flacone chiuso a temperatura ambiente (15 – 25° C).

Non usare il medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla confezione con la dicitura EXP.

Tenere i medicamenti fuori dalla portata dei bambini.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Allattamento:

Non usare in bovini e ovini in allattamento, il cui latte sia destinato al consumo umano.

Interazione con altri medicamenti e altre forme d'interazione:

Nessuna conosciuta

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Un sovradosaggio di cinque volte è ben tollerato nei suinetti e un triplice sovradosaggio nei vitelli.

Incompatibilità:

Questo medicamento veterinario non deve essere miscelato con altri medicamenti veterinari.

Proprietà ambientali

Il principio attivo di questo medicamento veterinario permane a lungo nel terreno ed è anche tossico per le piante (incl. le specie da raccolto).
Per impedire effetti indesiderati sulle piante e una possibile contaminazione delle acque di falda, il liquame e le deiezioni dei vitelli trattati non devono essere sparsi nei campi prima di essere miscelati con le deiezioni dei bovini non trattati. Prima di essere sparse sul terreno, le deiezioni dei vitelli trattati devono essere miscelate con quantità almeno tre volte superiori di deiezioni di bovini non trattati. Gli agnelli, che per l'intero ciclo di vita sono tenuti in un sistema di allevamento intensivo, non devono essere più trattati a partire dalle 6 settimane d'età o una volta superati i 20 kg di peso corporeo. Il letame o le deiezioni provenienti da animali trattati devono essere sparse sullo stesso appezzamento di terreno solo ogni tre anni.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicamenti veterinari non utilizzati e i rifiuti derivati da tali medicamenti veterinari devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Evitare la contaminazione dei corsi d'acqua. Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

19.09.2023
Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole con flacone da 100 ml in polietilene con tappo a vite in polipropilene
Scatola pieghevole con flacone da 250 ml in polietilene con tappo a vite in polipropilene
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria
Swissmedic 56127
Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.