

INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Marbocyl P 5 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde und Katzen

Marbocyl P 20 mg / 80 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Vetoquinol AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Bern

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Vetoquinol SA, Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankreich

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Marbocyl P 5 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde und Katzen

Marbocyl P 20 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde

Marbocyl P 80 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Tablette enthält:	Marbocyl P 5 mg	Marbocyl P 20 mg	Marbocyl P 80 mg
Marbofloxacin	5 mg	20 mg	80 mg

Tabletten zum Eingeben.

Beige, runde teilbare Tablette.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Infektionen mit Marbofloxacin-empfindlichen Erregern

- Oberflächliche und tiefe bakterielle Hautinfektionen bei Hund und Katze
- Bakterielle Atemwegsinfektion bei Hund und Katze
- Harnwegsinfektion mit den Bakterien *Proteus mirabilis* und *E. coli*, mit oder ohne begleitende Entzündungen von Prostata und/oder Nebenhoden beim Hund.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden, wenn die nachgewiesenen Bakterien resistent sind gegenüber Chinolonen (eine Gruppe keimtötender Antibiotika, zu der auch der Wirkstoff von Marbocyl P ad us. vet. Tabletten gehört).

Marbocyl P ad us. vet. Tabletten sollten bei Hunden grosser und sehr grosser Rassen, die weniger als 12 resp. 18 Monate alt sind, nicht angewendet werden, da die Gefahr einer Schädigung des Gelenkknorpels besteht. Bei mittelgrossen Rassen im Wachstum wird Marbofloxacin bei Gaben von bis zu 6 mg/kg/Tag während 13 Wochen gut vertragen.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10 000 behandelten Tieren) können Nebenwirkungen wie Erbrechen, weicher Kot, verändertes Durstgefühl und Hyperaktivität auftreten. Diese Nebenwirkungen verschwinden aber spontan wieder.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Empfohlene Dosierung 2 mg/kg einmal täglich

1 Tablette zu 5 mg für 2,5 kg Körpergewicht pro Tag

1 Tablette zu 20 mg für 10 kg Körpergewicht pro Tag

1 Tablette zu 80 mg für 40 kg Körpergewicht pro Tag

Dauer der Anwendung bei Hunden:

Bakterielle Hautinfektionen mind. 5 Tage; je nach Verlauf bis zu 40 Tage.

Akute Atemwegsinfektion 7 Tage; chronische Atemwegsinfektion 21 Tage.

Harnwegsinfektion ohne Entzündung von Prostata oder Nebenhoden mind. 10 Tage; übrige Fälle 28 Tage.

Dauer der Anwendung bei Katzen:

Infektion von Haut und Unterhaut-Gewebe 3 bis 5 Tage.

Atemwegsinfektion 5 Tage.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Die Eingabe erfolgt direkt oder eingehüllt in Fleisch bzw. Wurst.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Nicht verwendete Tablettenhälften sollten wieder in die Blisterpackung gelegt werden.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Marbocyl P ad us. vet. Tabletten sollen nur nach vorheriger Diagnosesicherung durch die Tierärztin/ den Tierarzt angewendet werden. Ausserdem sollen Marbocyl P Tabletten nur angewendet werden, wenn die Bakterien gegenüber anderen Antibiotika resistent sind. Der Einsatz von Marbocyl P ad us. vet. Tabletten sollte aus Gründen einer möglichen Resistenzentwicklung nicht bei geringfügigen Infektionen erfolgen. Bei Tieren mit bekannter Epilepsie/ Anfallsleiden sollte das Tierarzneimittel nur mit Vorsicht angewendet werden.

Da das Tierarzneimittel aromatisiert ist, besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen die Tabletten gezielt aufsuchen und übermässig aufnehmen. Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewahren.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender: Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden. Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich eine Ärztin / ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Nach der Anwendung Hände waschen.

Trächtigkeit und Laktation: Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und der Laktation ist nicht belegt. Studien an Labortieren (Ratten, Kaninchen) haben in den empfohlenen Dosen keine Wirkungen durch Marbofloxacin gezeigt, welche Fehlbildungen in einem Organismus auslösen, oder welche toxisch für den Embryo oder für das Muttertier sind. Eine Verabreichung des Tierarzneimittels an trächtige oder säugende Tiere sollte vermieden werden oder nur nach strenger Indikationsstellung durch die behandelnde Tierärztin / den behandelnden Tierarzt erfolgen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: Bei gleichzeitiger Eingabe von Substanzen, die Aluminium, Kalzium, Eisen oder Magnesium enthalten, kann die Wirkung von Marbofloxacin verringert sein.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel): Eine Überdosierung kann akute Anzeichen in Form von Störungen des Nervensystems verursachen. Diese sollten von Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt behandelt werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

19.12.2023

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Packungen:

Marbocyl P 5 mg, Faltschachteln mit 1 und 10 Blistern zu 10 Tabletten

Marbocyl P 20 mg, Faltschachteln mit 1 und 10 Blistern zu 10 Tabletten

Marbocyl P 80 mg, Faltschachteln mit 1 und 12 Blistern zu 6 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie A: einmalige Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 56899

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.