

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Profender ad us. vet., comprimés pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berne

Fabricants responsables de la libération des lots:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE – 24106 Kiel

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

F – 70200 Lure

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Profender ad us. vet., comprimés pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Composition:

1 comprimé contient:

Principes actifs:

Emodepside 10 mg, praziquantel 50 mg

Comprimé marron en forme d'os et une ligne de sécabilité sur chaque face.

Le comprimé peut être divisé en deux moitiés de taille égale.

4 INDICATION(S)

Pour les chiens infestés simultanément par des vers ronds et plats ou exposés à un risque d'infestation simultanée par des vers ronds et plats des espèces suivantes:

- Ascaris lombricoïdes et certaines larves de ces vers
- Ankylostomes
- Trichures et certaines larves de ces vers
- Vers plats (notamment *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis* et *Echinococcus granulosus*)

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 12 semaines ou de moins de 3 kg de poids corporel. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des autres composants.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

De légers troubles gastro-intestinaux passagers (tels que salivation, vomissements, diarrhée) ainsi que de légers troubles passagers du système nerveux (tels que tremblements, troubles de la coordination) ont été observés dans de très rares cas (moins d'un animal sur 10'000 animaux traités, y compris les cas isolés). Le jeûne nécessaire semble ne pas avoir été respecté dans ces cas-là. Par ailleurs, les collies, les bergers des Shetland et les bergers australiens atteints d'une certaine anomalie génétique peuvent montrer des signes de troubles du système nerveux plus importants (crampes, par exemple). Aucun antidote spécifique n'est connu.

Dans de très rares cas, des troubles du comportement, tels qu'un besoin exagéré de bouger (hyperactivité), peuvent survenir.

De très rares cas de perte d'appétit, d'augmentation de la température (hyperthermie), de léthargie et d'immobilité ont été rapportées.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacienne / pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Profender comprimés pour chiens s'administre avec une dose minimale de 1 mg d'emodepside par kg de poids corporel et de 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel conformément au tableau de dosage fourni.

Une seule utilisation par traitement suffit.

Poids corporel (kg)	Nombre de comprimés Profender® ad us. vet., comprimés pour chiens Profender® ad us. vet., comprimés pour chiens 1  = 10kg
› 3 - 5	½
› 5 - 10	1
› 10 - 15	1½
› 15 - 20	2
› 20 - 25	2½
› 25 - 30	3
› 30 - 35	3 ½

Pour les chiens plus lourds, donner ½ comprimé par 5 kg de poids corporel supplémentaires.

À donner à des chiens de plus de 12 semaines et d'au moins 3 kg. Les comprimés Profender pour chiens possèdent des arômes de viande et sont normalement bien acceptés par les chiens sans nourriture supplémentaire.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Administrar uniquement à des chiens à jeun. En cas de traitement matinal, faire jeûner le chien pendant la nuit. Le nourrir à nouveau au plus tôt 4 heures après le traitement.

Ne pas stocker les demi-comprimés restants pour une utilisation ultérieure.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur le contenant.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois concerné.

Ne pas stocker les demi-comprimés restants pour une utilisation ultérieure.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Après une utilisation fréquemment répétée de médicaments avec des principes actifs de classes similaires contre les infestations de vers, ces derniers peuvent devenir résistants à ces principes actifs.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Administer uniquement à des chiens à jeun. Voir section 8.

En cas d'infection existante par *Dipylidium caninum*, un traitement d'accompagnement contre les puces et les poux broyeur est recommandé afin de prévenir une réinfection dans la mesure où ces parasites peuvent transmettre des vers plats.

Compte tenu de la présence d'arômes dans ce médicament vétérinaire, chiens et chats peuvent éventuellement se mettre à la recherche des comprimés et les consommer en excès. Il convient donc de conserver cette préparation vétérinaire hors de leur portée.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Se laver les mains après l'administration des comprimés.

En cas d'ingestion accidentelle du médicament vétérinaire, notamment par des enfants, consulter un médecin et se reporter à la notice d'emballage ou à l'étiquette.

L'échinococcose (infection par *Echinococcus multilocularis* ou *Echinococcus granulosus*) présente également un danger pour l'humain. S'agissant d'une maladie à déclaration obligatoire selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), il convient de respecter des directives particulières en matière de traitement, d'inspections de suivi et de protection des personnes. Consulter un vétérinaire pour de plus amples informations.

Gestation et lactation:

Utilisable lors de la gestation et de la lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

Un traitement simultané avec d'autres médicaments vétérinaires, notamment certains autres principes actifs à effet antiparasitaire, peut éventuellement provoquer des interactions. Les conséquences potentielles de telles interactions n'ont pas été étudiées. Consulter un vétérinaire pour de plus amples informations.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

En cas de dosage jusqu'à cinq fois supérieur aux recommandations, certains chiens – à jeun, comme prévu – ont présenté de brefs tremblements musculaires, des troubles de la coordination et une apathie.

Chez certains collies atteints d'une anomalie génétique spécifique, de légers et brefs tremblements et/ou des troubles de la coordination ont été observés même en administrant simplement le double de la dose recommandée. Ces symptômes disparaissent complètement sans traitement. L'ingestion d'aliments peu de temps avant ou peu de temps après l'administration de comprimés peut augmenter la fréquence et l'intensité de tels symptômes de surdosage et provoquer occasionnellement des vomissements.

Incompatibilités:

Aucune connue.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les médicaments vétérinaires non utilisés ou les déchets qui en proviennent doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

Les demi-comprimés non utilisés ne doivent pas être stockés en vue d'une utilisation ultérieure et doivent être éliminés conformément à la réglementation.

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

14.01.2025

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Profender pour chiens

Boîte de 4 comprimés dans des emballages blister avec film aluminium

Boîte de 24 comprimés dans des emballages blister avec film aluminium

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 60071 003 4 comprimés

Swissmedic 60071 004 24 comprimés

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.