

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Milpro™ Chat S ad us. vet., comprimés pelliculés

Milpro™ Chat M ad us. vet., comprimés pelliculés

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots: Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06510 Carros, France

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Milpro Chat S ad us. vet., comprimés pelliculés

Milpro Chat M ad us. vet., comprimés pelliculés

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Milpro Chat S ad us. vet., comprimés pelliculés

1 comprimé pelliculé contient:

Substances actives:

Milbémycine oxime	4 mg
Praziquantel	10 mg

Milpro Chat M ad us. vet., comprimés pelliculés

1 comprimé pelliculé contient:

Substances actives:

Milbémycine oxime	16 mg
Praziquantel	40 mg

Comprimé pour administration orale.

Milpro Chat S ad us. vet., comprimé pelliculé: comprimé ovale et brun avec une rainure de rupture sur les deux faces.

Milpro Chat M ad us. vet., comprimé pelliculé: comprimé ovale, de couleur rouge à rose, avec une rainure de rupture sur les deux faces.

4 INDICATION(S)

Médicament vétérinaire efficace contre un large spectre de vers.

Milpro Chat est utilisé pour:

- le traitement des infestations par les ankylostomes, les vers ronds et les vers plats. Milpro est également efficace contre les stades immatures et adultes des *Echinococcus spp.*
- le traitement préventif des atteintes dues aux vers du cœur (*Dirofilaria immitis*)

5 CONTRE-INDICATIONS

Milpro Chat S: ne pas utiliser chez le chat pesant moins de 0,5 kg

Milpro Chat M: ne pas utiliser chez le chat pesant moins de 2 kg

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un principe actif ou à un autre composant.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés), en particulier chez les jeunes chats, des réactions d'hypersensibilité, des symptômes tels qu'une somnolence inhabituellement prononcée, des symptômes liés au système nerveux (tels qu'un trouble de la coordination des mouvements et des tremblements musculaires) et/ou des symptômes gastro-intestinaux (tels que des vomissements et des diarrhées) peuvent être observés après l'administration du médicament vétérinaire.

Si vous constatez des effets indésirables, notamment ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chat

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Dose minimale recommandée: 2 mg de milbémycine oxime et 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel sont administrés une seule fois par voie orale.

Administrar le médicament vétérinaire avec la nourriture ou directement après l'alimentation. Les comprimés Milpro Chat sont aromatisés et faciles à administrer (petits comprimés aromatisés).

En fonction du poids corporel du chat, la posologie pratique est la suivante:

Poids corporel	Milpro Chat S	Milpro Chat M
0,5 – 1 kg	½ comprimé	
> 1 – 2 kg	1 comprimé	
> 2 – 4 kg		½ comprimé
> 4 – 8 kg		1 comprimé
> 8 – 12 kg		1½ comprimés

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les vermifugations des chatons se pratiquent à l'âge de 6 semaines, puis tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Les chats adultes doivent être vermifugés 4 fois par an.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver les comprimés pelliculés Milpro Chat divisés en deux dans le blister ouvert et les utiliser dans les 6 mois. Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention «EXP».

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Milpro Chat S: Poids minimal 0,5 kg

Milpro Chat M: Poids minimal 2 kg

Précautions particulières d'emploi chez l'animal:

Selon les bonnes pratiques vétérinaires, les animaux doivent être pesés afin d'assurer un dosage précis. Assurez-vous que les chats et les chatons pesant entre 0,5 kg et ≤ 2 kg reçoivent le bon dosage de comprimés (4 mg de milbémycine oxime / 10 mg de praziquantel) ainsi que la dose

correcte (1/2 ou 1 comprimé) pour la catégorie de poids concernée (1/2 comprimé pour les chats pesant de 0,5 à 1 kg; 1 comprimé pour les chats pesant >1 kg à 2 kg).

Il est recommandé de traiter de façon concomitante tous les animaux vivant dans le même foyer. En cas d'infection par le ténia *Dipylidium caninum*, un traitement simultané contre les hôtes intermédiaires tels que les puces et les poux doit être envisagé en concertation avec le vétérinaire afin d'éviter une nouvelle infection.

Le médicament vétérinaire étant aromatisé, il existe un risque que les chiens et les chats recherchent les comprimés de manière sélective et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, la préparation doit être tenue hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Gestation et lactation

Milpro Chat peut également être utilisé chez les chattes en gestation ou en lactation. Les chattes allaitantes devraient être traitées en même temps que les chatons.

Surdosage:

Un surdosage peut entraîner une dilatation temporaire des pupilles (mydriase), un trouble de la coordination des mouvements (ataxie) et des tremblements musculaires (tremor), en particulier chez les jeunes animaux. Ces symptômes disparaissent en l'espace d'une journée sans traitement.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales. Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

Milpro Chat ne doit pas être déversé dans les cours d'eau, car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

04.10.2024

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Présentations:

Milpro Chat S: boîte pliante avec 2, 4 et 24 comprimés dans un blister plastique-aluminium

Milpro Chat M: boîte pliante avec 2, 4, 24 et 48 comprimés dans un blister plastique-aluminium

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 65'047

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionné à la rubrique 1.