



GRAEUB

GAMMASERIN[®] ad us. vet.

Bovine kolostrale Gammaglobuline Gammaglobuline

DE Zusammensetzung

Kolostrale Immunglobuline vom Rind:
1 ml Serum enthält:
Gammaglobuline 100 mg
mit spezifischen Antikörpertitern gegen
E. coli 78:80 B
E. coli K99
Rota- und Coronavirus
Conserv.: Phenol max. 5 mg

Eigenschaften / Wirkungen

Gammaserin enthält 10% spezifische und polyvalente Gammaglobuline, die durch verschiedene Reinigungs- und Anreicherungsprozesse aus Kolostralmilch isoliert werden. Gammaserin wird auf Reinheit, Sterilität, Verträglichkeit und Gehalt an spezifischen Antikörpern (E. coli 78:80 B, E. coli K99, Rota- und Coronaviren) geprüft. Dank seinem hohen Gehalt an spezifischen Antikörpern und dem breiten Wirkungsspektrum der polyvalenten Gammaglobuline lässt sich Gammaserin erfolgreich gegen die Colisepsis und die übrigen bakteriellen Aufzuchtkrankheiten der Kälber sowie gegen virale Infekte der Jungtiere einsetzen.

Indikationen

- Therapie und Prophylaxe von Colisepsis und Durchfällen neugeborener Kälber
- Therapie und Prophylaxe anderer Infektionskrankheiten neugeborener Kälber z. B. Pneumokokken, Salmonellen, Pasteurellen, Viren, Mycoplasmen
- Therapie von Hypo- und Agammaglobulinämie
- Erhöhung der unspezifischen Resistenz und Infektionsabwehr

Dosierung / Anwendung

Prophylaktisch: 20 ml s.c. und/oder p.o.
Therapeutisch: 0.5 - 1 ml pro kg KGW, s.c.
In schweren Fällen ist die Behandlung an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen zu wiederholen.

Die gleichzeitige Verabreichung von Antibiotika oder Chemotherapeutika sowie zusätzliche Vitamingaben sind zu empfehlen. Zudem soll den Kälbern möglichst frühzeitig Kolostralmilch gegeben werden.

Kontraindikationen

Keine bekannt.
Gammaglobuline können im Allgemeinen nicht überdosiert werden.

Unerwünschte Wirkungen

Keine bekannt.
Falls unerwünschte Wirkungen auftreten, insbesondere solche, die nicht aufgeführt sind, melden Sie diese unter www.vaccinovigilance.ch

Absetzfrist

Keine

Sonstige Hinweise

Bei 2 - 8°C und vor Licht geschützt lagern. Nicht gefrieren lassen. Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Der Inhalt angebrochener Flaschen ist innerhalb eines Tages zu verbrauchen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Packungen

Durchstechflasche zu 100 ml
Kunststoff-Einmalspritze zu 20 ml

ZulassungsinhaberIn

Dr. E. Graeub AG, Bern IVI Nr. 1095

Abgabekategorie: B

ATCvet-Code: QI02AM05

Informationsstand: 10/2009