



GRAEUB

GAMMASERIN[®] ad us. vet.

Gammaglobulines de colostrum bovin Gammaglobulines

DE Composition

Immunoglobulines de colostrum bovin:

1 ml de sérum contient:

Gammaglobulines 100 mg

avec anticorps spécifiques contre

E. coli 78:80 B

E. coli K99

rotavirus et coronavirus

Conserv.: phénol max. 5 mg

Propriétés / Effets

Gammaserin contient 10% de gammaglobulines spécifiques et polyvalentes, extraites de colostrum par divers procédés de purification et d'enrichissement. La pureté, la stérilité, la compatibilité et le teneur en anticorps spécifiques (E. coli 78:80 B, E. coli K99, rotavirus et coronavirus) sont vérifiées. Grâce à sa haute teneur en anticorps spécifiques et au large spectre d'action des gammaglobulines, cette préparation est particulièrement indiquée pour le traitement ou la prévention de la coli-septicémie et autres maladies bactériennes ou virales des jeunes veaux.

Indications

- Traitement et prévention de la coli-septicémie et des diarrhées des veaux nouveau-nés.
- Traitement et prévention d'autres maladies infectieuses du veau nouveau-né comme p. ex. pneumocoques, salmonelles, pasteurelles, virus, mycoplasmes.
- Traitement de l'hypo- et de l'agammaglobulinémie.
- Renforcement de la résistance non-spécifique et de la défense immunitaire.

Posologie / Mode d'emploi

Prévention: 20 ml s.c. et/ou par voie orale.

Traitement: 0.5 à 1 ml par kg PC, s.c.

Dans les cas graves, le traitement doit être répété pendant plusieurs jours consécutifs. Il est recommandé d'administrer simultanément des antibiotiques ou des chimiothérapeutiques ainsi que des vitamines. Il est également recommandé de donner du colostrum le plus tôt possible aux veaux.

Contre-indication

Aucune connue.

En général, les gammaglobulines ne peuvent pas être surdosées.

Effets indésirables

Aucun connu.

Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d'autres que ceux mentionnés ci-dessus, il faut les annoncer sur le site www.vaccinovigilance.ch.

Délai d'attente

Aucun

Remarques particulières

Conserver entre 2 et 8°C et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date indiquée avec «EXP.» sur l'emballage. Le flacon entamé doit être utilisé en l'espace d'un jour afin d'éviter toute contamination. Tenir hors de portée des enfants.

Présentation

Flacon de 100 ml avec bouchon perforable

Seringue à usage unique en matière synthétique de 20 ml

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne No IVI 1095

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI02AM05

Mise à jour de l'information: 10/2009