

Cryomarex Rispens + HVT ad us. vet.

Vaccin vivant contre la maladie de Marek des poules

Composition

Chaque dose de vaccin contient:

Herpèsvirus des poules (souche Rispens)	min. 1000 UFP
Herpèsvirus des dindes (souche FC126)	min. 1000 UFP

Diluant

Dilumarex

Indications

Immunisation active des poussins contre la maladie de Marek, pour la protection contre les cas de mort et les changements cliniques liés à la maladie de Marek.

Posologie / Mode d'emploi

Posologie et mode d'emploi

Injecter 0.2 ml par animal à l'âge de 1 jour par voie intramusculaire ou sous-cutanée, avant la sortie du couvoir.

Préparation du vaccin

1. Sortir de l'azote liquide la quantité d'ampoules qui seront utilisées immédiatement.
2. Décongeler rapidement le contenu des ampoules en les remuant dans de l'eau chaude à 25-30°C. Dès que le contenu est complètement décongelé, ouvrir les ampoules à bout de bras afin d'éviter tout risque de blessure en cas de fracture de l'ampoule.
3. Aspirer le contenu de l'ampoule dans une seringue de 5 ml.
4. Transférer la suspension dans une bouteille de diluant (Dilumarex) préalablement ramenée à température ambiante (20 ± 5° C).
5. Aspirer 2 ml du contenu de la bouteille de solution dans la seringue. Rincer l'ampoule avec ces 2 ml et transférer la solution de rinçage dans la bouteille de solution. Renouveler cette opération de rinçage 1 ou 2 fois.
6. Mélanger le vaccin en remuant légèrement. Le vaccin préparé doit être utilisé immédiatement, et la totalité du vaccin dilué doit être utilisé en 1 heure.
7. Pendant la vaccination le vaccin dilué doit être régulièrement mélangé par agitation ou sur un agitateur magnétique.

Limitations d'emploi

Contre-indications

Ne vacciner que des animaux en bonne santé.

Effets indésirables

Aucun.

Les cas d'effets indésirables doivent être annoncés à www.vaccinovigilance.ch.

Délai d'attente

Zéro jour.

Interactions

Il n'existe aucun résultat expérimental sur l'innocuité et l'efficacité de Cryomarex Rispens + HVT administré en même temps qu'un autre vaccin. En conséquence, aucun autre vaccin ne doit être appliqué durant les 14 jours qui précèdent et qui suivent la vaccination avec Cryomarex Rispens + HVT.

Remarques particulières

Précautions et conseils

1. Azote liquide : Pendant la sortie des ampoules de l'azote liquide et la préparation du vaccin, des mesures doivent être prises pour écarter les risques de blessure. Protéger le visage et les yeux avec un masque ou des lunettes de protection, et les mains avec des gants de protection robustes. Il faut porter des vêtements de protection qui protègent intégralement la peau (par ex. overall).
2. En cas de contact avec l'azote liquide, prendre les mesures de premier secours suivantes: bien rincer les parties atteintes à l'eau chaude, ensuite sécher doucement et traiter comme une brûlure. Si les yeux sont atteints un rinçage immédiat et intensif est très important. Une attention particulière est requise si des bagues sont portées car elles peuvent refroidir très rapidement. Ne pas frotter les parties touchées. Demander de l'aide médicale aussi vite que possible.
3. Après l'injection se laver soigneusement les mains.
4. Eviter le stress pour les animaux avant et après la vaccination.
5. Eviter la vaccination dans ou à proximité des articulations et des tendons.
6. Eliminer les ampoules décongelées non utilisées; ne recongeler en aucun cas des ampoules décongelées.
7. Eliminer de façon non nuisible le vaccin décongelé et non utilisé, ou le stériliser à la chaleur, ou le traiter avec un moyen de désinfection adapté.
8. La souche de virus Rispens est éliminée par les sujets vaccinés et peut être transmise à d'autres animaux.
9. Une petite partie des animaux vaccinés peut réagir de façon insuffisante à la vaccination. La réponse immunitaire est influencée par beaucoup de facteurs, tel l'âge, d'autres infections, le stress, des différences génétiques, l'état de nutrition, etc. Le développement d'une immunité active peut aussi être influencé par l'existence d'anticorps maternels, comme par exemple des poulets dont les parents ont été vaccinés ou ont surmonté une infection.
10. Médicament à tenir hors de la portée des enfants!

Conservation

Cryomarex Rispens + HVT doit être conservé dans l'azote liquide (-196°C).

Présentations

Ampoules à 1000 doses
Diluant: Dilumarex à 200 ml

Catégorie de remise: B
ATCvet-Code: QI01AD03

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

No IVI: 1614

Mise à jour de l'information

Février 2013