

LOCATIM®

ad us. vet.

Immunoglobulines anti *E. coli*, Rotavirus, Coronavirus et polyvalentes

COMPOSITION

Le LOCATIM® est une préparation d'immunoglobulines colostrales bovines pour voie orale à titres élevés d'anticorps spécifiques contre les:

- Rotavirus
- Coronavirus
- facteurs d'attachement *E. coli* K99, F41, Att25, Cs31A
- sérotypes *E. coli* 0101:K99 F41, 09:K30 K99 F41, 08:K85 K99 et 0101:K30 F41 de la forme entéritique/entérotoxémique
- sérotypes *E. coli* 078:80B, 0115:B, 015:K, 086:B7, 0117:K98 de la forme septicémique

1 ml contient :

Immunoglobulines bovines spécifiques et polyvalentes min. 65 mg

Agents conservateurs: Parahydroxybenzoate de méthyle ≤0.8 mg/ml

GÉNÉRALITÉS

Les anticorps du LOCATIM® couvrent les agents et facteurs infectieux représentant les causes les plus fréquentes et les risques majeurs de mortalité et de morbidité néonatales chez le veau et l'agneau.

L'administration par voie orale assure l'apport massif d'anticorps dans l'intestin où ils peuvent développer leur action locale (neutralisante, anti-attachement à la muqueuse intestinale, opsonisante et antitoxique) contre les *E. coli* de la forme entéritique/entérotoxémique et contre les Rotavirus et les Coronavirus.

Lorsque le LOCATIM® est donné précocement pendant la période de résorption des immunoglobulines au niveau de l'intestin, il contribue aussi à la protection humorale.

INDICATIONS

Prophylaxie et thérapie chez les veaux et les agneaux nouveau-nés

- des colibacilloses, principalement des formes entéritiques/entérotoxémiques
- des entérites à Rotavirus et à Coronavirus ou à infection mixte *E. coli*-virus

Augmentation de la résistance anti-infectieuse des porcelets.

Prophylaxie de la transmission de l'arthrite-encéphalite caprine (CAE) par substitution totale du colostrum de la mère chez les cabris. Complémentation du lait chez les veaux, petits ruminants, porcelets nouveau-nés qui ne peuvent pas absorber de colostrum maternel.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Voie d'administration: orale
Veiller à la succion de l'animal.

VEAUX

Prophylaxie

Colibacillose forme entéritique/entérotexémique précoce:

- 60 ml dans les 3 premières heures de la vie du veau, mélangé avec une petite quantité du premier colostrum. Compléter ensuite avec l'administration habituelle maximale du colostrum.

Rotaviroses, Coronaviroses, colibacilloses intestinales plus tardives ou entérites à infection mixte *E. coli* et virus:

- 60 ml dans les 3 premières heures de la vie du veau avec une petite quantité du premier colostrum comme ci-dessus;
- pendant la période dangereuse, mais le plus souvent dès le jour 4: 20–30 ml par jour avec du lait ou mieux avec du colostrum conservé, réchauffé à la température corporelle.

Thérapie

60 ml dès les premiers symptômes d'entérite.

Poursuivre le traitement avec 30 ml/jour. LOCATIM® peut être combiné au traitement anti-diarrhéique habituel.

AGNEAUX

6–12 ml dans un peu de colostrum ou de lait dans les 3 premières heures de la vie.

3–6 ml par jour pendant la période dangereuse.

PORCELETS

5 ml 1–2 fois dans les premières 12 heures de la vie (la première administration dans les 3 premières heures de la vie). Si nécessaire, 3 ml par jour pendant les 3 à 5 premiers jours de vie.

CABRIS

Prophylaxie de la transmission de la CAE par le colostrum de la mère

6 ml par kg de poids corporel dans les 3 premières heures de la vie.

Le traitement peut être poursuivi selon le schéma ci-dessous.

Complémentation du lait chez les animaux nouveau-nés qui ne reçoivent pas de colostrum maternel

Veaux, petits ruminants, porcelets:

Ajouter du LOCATIM® à raison de 6–15% de la ration de lait (de vache par exemple) administrée le premier jour, puis de 3–6% les jours suivants.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune

DÉLAIS D'ATTENTE

0 jours

EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun connu

CONSERVATION

Entre 2°C et 8°C et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. Une fois ouvert, utiliser dans les 6 jours, en conservant toujours au frigo. Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «Exp».

PRÉSENTATION

Flacon de 60 ml

Mise à jour de l'information : avril 2018

IVI No 1636

Fabricant/Distributeur

BIOKEMA SA
Crissier-Lausanne