

PUREVAX® RCP ad us. vet.

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

ZUSAMMENSETZUNG

Eine Dosis zu 1 ml enthält :

Gefriergetrocknetes Pellet :

Attenuiertes felines Rhinotracheitis-Virus (Herpesvirus Stamm FHV F2) $\geq 10^{4,9}$ GKID₅₀¹

Inaktivierte feline Calicivirus-Antigene (Stämme FCV 431 und G1) $\geq 2,0$ ELISA-E

Attenuiertes felines Panleukopenievirus (Stamm PLI IV) $\geq 10^{3,5}$ GKID₅₀¹

Lösungsmittel :

Wasser für Injektionszwecke q.s.p. 1 ml

¹ Gewebekulturinfektiöse Dosis 50 %

EIGENSCHAFTEN / WIRKUNGEN

Die Impfung mit Purevax® RCP ist ab einem Alter von 8 Wochen möglich.

Die Impfung vermindert klinische Symptome nach einer Infektion mit felinen Herpes- oder Caliciviren, und schützt vor Panleukopenie.

Die Immunität setzt 1 Woche nach der Grundimmunisierung ein.

Die Dauer der Immunität gegen Rhinotracheitis (felines Herpesvirus), Calicivirus-Infektion und Panleukopenie beträgt 3 Jahre nach der letzten Wiederholungsimpfung.

Für die Calicivirus-Komponente wurde eine Verringerung der Virusausscheidung zu Beginn der Immunitätsausbildung und 1 Jahr nach der Impfung gezeigt.

INDIKATIONEN

Aktive Immunisierung von Katzen gegen feline Rhinotracheitis (Herpesvirus-Infektion), Calicivirus-Infektion und gegen feline Panleukopenie.

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Nach Auflösen des gefriergetrockneten Impfstoffs mit dem Lösungsmittel ist eine Dosis von 1 ml subkutan entsprechend dem folgenden Impfplan zu injizieren:

Grundimmunisierung:

- erste Injektion: ab einem Alter von 8 Wochen,
- zweite Injektion: 3 bis 4 Wochen später.

Wenn hohe Serumspiegel maternalen Antikörper vorhanden sind, sollte der Beginn der Grundimmunisierung bis zum Alter von 12 Wochen hinausgeschoben werden.

Wiederholungsimpfungen:

- Die erste Wiederholungsimpfung muss ein Jahr nach der Grundimmunisierung erfolgen.
- Weitere Wiederholungsimpfungen gegen Rhinotracheitis, Calicivirus-Infektion und Panleukopenie müssen in Abständen von bis zu 3 Jahren erfolgen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Nach dem Auflösen sofort anwenden.

Nicht mit einem anderen Impfstoff oder immunologischen Produkt ausser mit Purevax® FeLV mischen.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Gegenanzeigen

Nicht bei trächtigen Tieren anwenden.

Vorsichtsmassnahmen

Nur gesunde Tiere impfen.

Die Anwendung während der Laktation wird nicht empfohlen.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Unter normalen Anwendungsbedingungen können vorübergehende Apathie und Anorexie sowie erhöhte Körpertemperatur (gewöhnlich für eine Dauer von 1 bis 2 Tagen) auftreten.

Eine Lokalreaktion (leichter Schmerz beim Betasten, Juckreiz oder eine umschriebene Schwellung) ist möglich, die innerhalb von 2 Wochen wieder verschwindet.

Wie bei jedem Impfstoff, kann es unter besonderen Umständen zu

Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, die symptomatisch behandelt werden sollen.

Falls unerwünschte Wirkungen auftreten, insbesondere solche die nicht aufgeführt sind, melden Sie diese unter www.vaccinovigilance.ch.

SONSTIGE HINWEISE

Lagerung

Kühl lagern (2°C – 8°C). Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.
Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Wichtige Hinweise

Bei versehentlicher Selbstinjektion ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

PACKUNGEN

Packung mit 10 Dosen: gefriergetrockneter Impfstoff (10 Glasflaschen) + Lösungsmittel (10 Glasflaschen)

Abgabekategorie: B

ATCvet-Code: QI06AH09

Zulassungsinhaberin

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

IVI Nr: 1653

Stand der Information

Juni 2015