

## PUREVAX® RCPCh ad us. vet.

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable

### COMPOSITION

Par dose de 1 ml:

#### Lyophilisat:

Herpèsvirus atténué de la rhinotrachéite féline (souche FHV F2)	$\geq 10^{4,9}$ DICC <sub>50</sub> <sup>1</sup>
Antigènes inactivés de la calicivirose féline (souches FCV 431 et G1)	$\geq 2.0$ U. ELISA
<i>Chlamydomphila felis</i> atténué (souche 905)	$\geq 10^{3,0}$ DIO <sub>50</sub> <sup>2</sup>
Virus atténué de la panleucopénie infectieuse du chat (PLI IV)	$\geq 10^{3,5}$ DICC <sub>50</sub> <sup>1</sup>

#### Solvant:

Eau pour préparations injectables	q.s.p. 1 ml
-----------------------------------	-------------

<sup>1</sup> dose infectieuse culture cellulaire 50 %

<sup>2</sup> dose infectante sur œufs 50 %

### INDICATIONS

Immunsation active des chats contre la rhinotrachéite infectieuse féline (herpèsvirus), contre la calicivirose féline, contre les infections causées par *Chlamydomphila felis* et contre la panleucopénie infectieuse féline.

### PROPRIETES / EFFETS

La vaccination avec Purevax® RCPCh est possible à partir de l'âge de 8 semaines.

La vaccination réduit les signes cliniques après une infection causée par des virus herpès ou calicivirus ou par *Chlamydomphila felis*, et protège contre la panleucopénie.

La mise en place de l'immunité a lieu dès 1 semaine après la primovaccination.

La durée d'immunité après le dernier rappel est de 3 ans pour les valences rhinotrachéite, calicivirose et panleucopénie féline et de 1 an pour la valence Chlamydomphilose.

Il a été montré que le médicament vétérinaire réduit l'excrétion du calicivirus félin à la mise en place de l'immunité et pendant un an après la vaccination.

### POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI

Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, après reconstitution du vaccin avec le solvant, selon le calendrier vaccinal suivant:

**Primovaccination:**

- première injection: à partir de l'âge de 8 semaines,
- seconde injection: 3 à 4 semaines plus tard.

En présence d'un taux élevé en anticorps maternels, le calendrier vaccinal doit être appliqué à partir de l'âge de 12 semaines.

**Rappels:**

- le premier rappel doit être effectué pour toutes les valences un an après la primovaccination,
- les rappels suivants doivent être effectués : tous les ans pour la valence chlamydophilose et à intervalles de 3 ans maximum pour les valences rhinotrachéite, calicivirose et panleucopénie.

**Conseils pour une administration correcte**

Utiliser immédiatement après reconstitution.

Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques, hormis le Purevax® FeLV.

**LIMITATIONS D'EMPLOI****Contre-indications**

Ne pas utiliser chez les femelles gestantes.

**Précautions**

Utiliser seulement chez les chats en bonne santé.

L'utilisation n'est pas recommandée chez les animaux en lactation.

**EFFETS INDESIRABLES**

Dans des conditions normales d'utilisation, une apathie transitoire, une anorexie ainsi qu'une hyperthermie (pendant 1 ou 2 jours) peuvent être observées. Une réaction locale (légère douleur lors de la palpation, prurit ou œdème léger) peut également apparaître, qui disparaît en 2 semaines.

Comme pour tout vaccin, une réaction d'hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.

Dans des cas très rares, de l'hyperthermie et de la léthargie parfois associées avec des

boiteries ont pu être observées une à trois semaines après la vaccination de rappel chez des chats adultes. Ces réactions étaient transitoires.

Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d'autres que ceux mentionnés ci-dessus, il faut les communiquer sous [www.vaccinovigilance.ch](http://www.vaccinovigilance.ch).

## **REMARQUES PARTICULIERES**

### **Conservation**

À conserver à une température entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Remarques importantes**

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin, montrez-lui la notice ou l'étiquetage et informez-le qu'il s'agit d'une auto-injection avec un vaccin vivant contre la chlamyphilose.

Ce vaccin ne doit pas être manipulé par des personnes immunodéprimées ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs.

## **PRESENTATIONS**

Boîte de 10 doses: Lyophilisat (10 flacons) + solvant (10 flacons)

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI06AJ03

### **Titulaire de l'autorisation**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

**No IVI: 1654**

### **Mise à jour de l'information**

Juin 2015