

# **BTPPUR BTV 8**

ad us. vet.

Vaccin inactivé contre la maladie de la langue bleue (Bluetongue)

Suspension pour injection pour ovins et bovins

## **Composition**

Une dose de 1 ml de vaccin contient :

*Principe actif :*

Virus inactivé Bluetongue, sérotype 8  $\geq 2.1 \log_{10}$  pixels \*

*Adjuvants :*

Aluminium (sous forme d'hydroxyde) 2,7 mg

Saponine 30 HU \*\*

Excipients q.s. 1 ml

\* Concentration en antigène (protéine VP2) par immuno-essai

\*\* Unités hémolytiques

## **Propriétés/Effets**

Le vaccin contient le sérotype 8 du virus inactivé Bluetongue. Il induit chez l'animal vacciné une immunité active et spécifique contre le sérotype 8 du virus Bluetongue. La mise en place de l'immunité a été démontrée 3 semaines après la primovaccination. La durée d'immunité chez les bovins et les ovins est d'un an après la primovaccination.

## **Indications**

Immunsation active des ovins et des bovins pour prévenir la virémie et réduire les signes cliniques causés par le sérotype 8 du virus Bluetongue.

## **Mode d'emploi et posologie**

Agiter doucement juste avant l'emploi. Éviter la formation de mousse car cela peut être irritant au point d'injection.

Administrer une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon le schéma de vaccination suivant :

*Primovaccination*

Chez les bovins et les ovins

1re injection : Dès 1 mois d'âge ou, chez les animaux nés de mères vaccinées, dès 2.5 mois d'âge.

2e injection : après 3 ou 4 semaines.

*Rappels*

1 injection chaque année, un mois avant l'apparition des arthropodes vecteurs en zones d'épidémie.

## Limitations d'emploi

### *Contre-indications*

Aucune.

L'impact de la vaccination sur les fonctions reproductrices du mâle (spermatogenèse) n'a pas été étudié.

### *Précautions*

- Ne vacciner que les animaux en bonne santé.
- Respecter les conditions habituelles d'asepsie.
- Ne pas mélanger avec d'autres médicaments immunologiques.
- Le vaccin peut être utilisé durant la gestation chez la brebis, et durant la gestation et la lactation chez la vache.

## Effets indésirables

La vaccination peut être suivie par une légère réaction inflammatoire au site d'injection et/ou une légère hyperthermie, de courte durée.

Si vous observez des effets indésirables, en particulier des effets non décrits dans cette notice d'emballage, veuillez les annoncer à [www.vaccinovigilance.ch](http://www.vaccinovigilance.ch).

## Temps d'attente

Zéro jour.

## Interactions

Aucune information n'est disponible concernant la sécurité et l'efficacité de ce vaccin en cas d'application simultanée avec d'autres vaccins. Par conséquent, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

## Remarques particulières

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

## Conservation

- À conserver et transporter réfrigéré (+2 °C à +8 °C) et à l'abri de la lumière et du gel. Conserver dans l'emballage original.
- Tout flacon entamé doit être utilisé dans la même journée.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

## **Emballages**

Flacon de 50 ou 100 doses.

Boîte de 10 flacons de 50 ou 100 doses.

Fabricant  
Boehringer Ingelheim, Lyon/France

Titulaire de l'autorisation  
CH – 1023 Crissier-Lausanne

N° IVI : 1695

Catégorie de remise : B

Mise à jour de l'information : janvier 2017