

Gallivac IB88

Biokema ad us.vet.

IVI Nr.1730

Attenuierter Lebendimpfstoff gegen das respiratorische Coronavirus-Syndrom der Hühner verursacht durch Variantstämme der CR88 Gruppe

Zusammensetzung

Jede Dosis des Impfstoffs enthält:

Attenuiertes Coronavirus der Infektiösen Bronchitis der Hühner

Stamm CR88121 min. 4.0 log10 EID50

Indikationen

Aktive Immunisierung von Hühnerküken gegen infektiöse Bronchitis, welche durch Coronavirus- Variantstämme der CR88 Gruppe (793 B, 3/91, 4/91, 5/91) verursacht werden.

IB-Variant-Impfstoffe sollten nur in Regionen eingesetzt werden, in denen die zu den Impfstämmen korrespondierenden Feldstämme nachgewiesen, resp. von epidemiologischer Relevanz sind.

Dosierung und Verabreichung

Eine Dose Impfstoff pro Tier mittels Spray im Alter von 14 Tagen.

Den gefriergetrockneten Impfstoff in 3-5 ml demineralisiertem oder destilliertem Wasser auflösen, danach in einer Menge Wasser entsprechend der Anzahl der zu impfenden Tiere weiter verdünnen (die Wassermenge dem Sprühgerät anpassen, z.B. Model Ulvavac der Firma MERIAL SAS, F-69007 Lyon). Nach Auflösen ist der Impfstoff innerhalb von 2 Stunden zu verbrauchen.

Nach Schliessung der Stalllüftung (für max. 30 Min.) wird die gebrauchsfertige Impfstofflösung über den Küken versprüht. Dabei sollte eine mittlere Tröpfchengrösse von ca. 80-150 µm erzeugt werden (gross tropfiger Nebel). Keine Geräte verwenden die ein Aerosol mit einer Tröpfchengrösse unter 50 µm Durchmesser erzeugen („Fogger“).

Kontraindikationen

Nur gesunde Tiere impfen. Darf nicht bei Legehennen verwendet werden.

Nebenwirkungen

Während bis zu 14 Tagen nach der Impfung können milde Symptome des oberen Atmungsapparates beobachtet werden

Falls unerwünschte Wirkungen auftreten, insbesondere solche die nicht aufgeführt sind, melden Sie diese unter www.vaccinovigilance.ch.

Absetzfristen:

0 Tage

Interaktionen:

Es liegen keine Untersuchungsergebnisse zur Verträglichkeit und Wirksamkeit bei gleichzeitiger Anwendung von Gallivac IB88 und andern Impfstoffen vor. Deshalb sollen 14 Tage vor und nach der Impfung mit Gallivac IB88 keine andern Impfstoffe verabreicht werden.

Vorsichtsmassnahmen und Hinweise

1. Während des Versprühens des Impfstoffes Atem- und Augenschutz tragen.
2. Für die Zubereitung des Impfstoffes dürfen nur Gerätschaften und Wasser verwendet werden, die frei von Antiseptika und/oder Desinfektionsmitteln sind.
3. Nach der Impfung sind die Hände gründlich zu waschen.
4. Aufgelöste und nicht verwendete Impfstoffmengen unschädlich beseitigen oder hitzesterilisieren bzw. mit geeigneten Desinfektionsmitteln behandeln.
5. Die Impfung mit Gallivac IB88 ersetzt die Impfung mit den herkömmlichen Impfstoffen gegen die Infektiöse Bronchitis nicht!
6. Das Impfvirus kann auf ungeimpfte Tiere übertragen werden. Die Infektion von ungeimpften Tieren durch Impfvirus, das von geimpften Hühnern ausgeschieden wurde, verursacht keine Krankheitssymptome.
7. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Lagerung

Im Kühlschrank bei einer Temperatur zwischen +2°C und +8°C und vor Licht geschützt lagern.
Nicht gefrieren!

Packungen

Flaschen zu 1000 Dosen

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Hersteller

MERIAL SAS
29, avenue Tony Garnier
F-69007 Lyon

Vertrieb

Biokema SA
CH-1023 Crissier-Lausanne

Informationsstand: März 2013