

ad us. vet.

Enteran[®]

**Antibiotikum / Chemotherapeutikum
in Pulverform für Schweine, Kälber
und Lämmer**

**Poudre antibiotique pour porcs,
veaux et agneaux**

5 kg

graeub

Zusammensetzung | Composition

Neomycinum 360 mg ut neomycini sulfas,
Phthalylsulfathiazolum 2.5 g, Tanninum albumi-
natum 0.2 g, Kaolinum ponderosum q. s. pro 10 g

Indikationen

Durchfall bei Schweinen, Ferkeln, Kälbern und
Lämmern

Dosierung / Anwendung

Schwein, Kalb:

- 1. Tag: 2 Messlöffel

- 2. + 3. Tag: 1 Messlöffel

Ferkel, Lamm:

- 1. Tag: ½ Messlöffel

- 2. + 3. Tag: ¼ Messlöffel

1 Messlöffel = 10 g Pulver

In etwas Tee oder warmem Wasser

Absetzfristen

Essbare Gewebe:

- Schwein, Ferkel und Lamm mit Ausnahme
der Nieren: 3 Tage

- Kalb mit Ausnahme der Nieren: 5 Tage

Nieren:

- Kalb, Schwein, Ferkel und Lamm: 7 Tage

Sonstige Hinweise

Trocken und bei Raumtemperatur (15 - 25°C)
lagern. Nur bis zum mit «EXP.» bezeichneten
Datum verwenden. Medikament ausser
Reichweite von Kindern aufbewahren.

Packungen

10 x 10 g, 500 g, 5 kg

Zulassungsinhaber | Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeb AG, Bern

Swissmedic 27'435'068
ATCvet-Code: QA07AA51



Indications

Diarrhée chez les porcs, porcelets, veaux et
agneaux

Posologie / Mode d'emploi

Porc, veau:

- 1er jour: 2 mesures

- 2e + 3e jour: 1 mesure

Porcelet, agneau:

- 1er jour: ½ mesure

- 2e + 3e jour: ¼ mesure

1 mesure = 10 g de poudre

Dans un peu de thé ou d'eau chaude

Délais d'attente

Tissus comestibles:

- Porc, porcelet et agneau à l'exception des
reins: 3 jours

- Veau à l'exception des reins: 5 jours

Reins:

- Veau, porc, porcelet et agneau: 7 jours

Remarques particulières

Conserver au sec et à température
ambiante (15 - 25°C). Utiliser avant la date
indiquée avec «EXP.». Tenir hors de portée
des enfants.

Présentations

10 x 10 g, 500 g, 5 kg

Stand der Information | Mise à jour de
l'information: 06.2003

Lot:

EXP.:

11.431.1310