



## **6. EFFETTI COLLATERALI**

Aumento delle contrazioni uterine. Lacerazione uterina (soprattutto nei carnivori).

Contrazione permanente dell'utero con conseguente blocco del flusso sanguigno nei vasi ombelicali, mancanza di ossigeno nel feto e riduzione della vitalità dei feti.

In associazione a un trattamento per l'induzione del parto nella scrofa: contrazione permanente dell'utero, prolungamento della durata del parto, distacco prematuro della placenta.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

## **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Ruminanti, equini, suini, cani e gatti.

## **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Equine	1-2 ml (10-20 U.I.) nel muscolo o fino a 1 ml (fino a 10 U.I.) in vena
Bovine	4-6 ml (40-60 U.I.) nel muscolo o 1-3 ml (10-30 U.I.) in vena o per via sacrale
Scrofe	2-4 ml (20-40 U.I.) nel muscolo o 1-2 ml (10-20 U.I.) in vena
Pecore, capre	1-2 ml (10-20 U.I.) nel muscolo o 0.5-1 ml (5-10 U.I.) in vena
Cagne	0.5-1 ml (5-10 U.I.) nel muscolo o 0.3-0.6 ml (3-6 U.I.) in vena
Gatte	0.3-0.5 ml (3-5 U.I.) nel muscolo

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

L'iniezione endovenosa deve essere somministrata lentamente nella vena!

Non ripetere l'iniezione prima di due ore.

## **10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Nessuno.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in frigorifero (2 °C – 8 °C).

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 7 giorni a temperature inferiori a 25 °C.

Il medicamento non deve più essere utilizzato dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

In caso di autoiniezione accidentale, consultare immediatamente un medico. Le donne gravide, soprattutto nell'ultimo trimestre di gravidanza, devono evitare il contatto con il prodotto, poiché il principio attivo ossitocina può indurre contrazioni della muscolatura (ad es. dell'utero).

Gravidanza:

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

I medicinali utilizzati per l'induzione del parto (ad es. beta-bloccanti e prostaglandine) potenziano le proprietà di stimolazione del travaglio del principio attivo ossitocina.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Dosaggi eccessivi possono determinare:

- vasodilatazione di breve durata e riduzione della pressione sanguigna
- aumentato accumulo di liquidi nel corpo (ritenzione idrica), contrazione permanente dell'utero con conseguente blocco del flusso sanguigno nei vasi ombelicali, mancanza di ossigeno nel feto e riduzione della vitalità dei feti
- aumento della frequenza cardiaca
- lacerazione dell'utero
- gravi complicazioni del parto nell'equino
- ritenzione del parto nella scrofa

In questi casi, il trattamento con ossitocina deve essere interrotto.

Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

## **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

## **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

26.01.2022

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Scatola con 1 flacone da 50 ml o 100 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria.

Swissmedic 33'450.

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.