

PACKUNGSBEILAGE

Stullmisan® S ad us. vet., Pulver für Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel und Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern
Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller: Pharma Stulln GmbH, Werkstrasse 3, 92551 Stulln, DE

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Stullmisan® S ad us. vet., Pulver für Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel und Hunde

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g enthält:

Wirkstoff:

Fichtenspitzenextrakt	30.56 mg
-----------------------	----------

Sonstige Bestandteile:

Methyl-4-hydroxybenzoat (E218)	8.05 mg
--------------------------------	---------

Propyl-4-hydroxybenzoat	3.45 mg
-------------------------	---------

Kräuterextrakt bestehend aus:

Kamillenblütenextrakt, Melissenblätterextrakt, Wermutkrautextrakt

Maisstärke

Bräunliches, rieselfähiges Pulver zum Eingeben

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Durchfall, Futterzusatz bei Aufzuchtsschwierigkeiten, Fressunlust, nicht ausreichende Muttermilch.

5. GEGENANZEIGEN

Keine.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

7. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel und Hunde

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Pulver zum Eingeben über Futter oder Trinkwasser bzw. Milch.

Pferde, Rinder	ca. 50 g (½ Beutel)	1x täglich
Fohlen, Kälber	ca. 25 g (¼ Beutel)	1x täglich
Schafe	ca. 8 g (1 gestr. Esslöffel)	3x täglich
Läufer, Absetzferkel	ca. 12 g (1½ gestr. Essl.)	1x täglich
Saugferkel	ca. 2 g (1 gestr. Teel. pro Saugferkel)	3x täglich
grosse Hunde	ca. 8 g (1 gestr. Essl.)	3x täglich
Küken	1 Essl. pro 10 Küken	1x täglich

Die abgemessene Dosis mit einer Handvoll Roggen- oder Weizenschrot bzw. Kleie vermischt zu fressen geben. Wenn das Tier nicht mehr frisst, kann Stullmisan® S mit Wasser verrührt zum Trinken gegeben werden.

Für Jungtiere, die mit Milch oder dünnbreiigem Futter gefüttert werden, Stullmisan® S in einer Tasse mit etwas Wasser oder Milch anrühren, diesen Brei zur Futtermilch bzw. zum Futterbrei geben und gut vermischen. Für Küken Stullmisan® S ins Trinkwasser mischen oder dem Weichfutter beimengen.

Im Allgemeinen genügt eine eintägige Behandlung.

Es wird empfohlen, je nach Gewicht des Tieres etwas höher zu dosieren, bzw. bei Grosstieren eine 2-tägige Behandlung durchzuführen. Es besteht keine Gefahr einer Überdosierung.

Bei frühzeitigem Absetzen von Jungtieren, insbesondere von Ferkeln und Kälbern, oder bei fehlender bzw. nicht ausreichender Muttermilch Stullmisan® S zusammen mit der Ersatzmilch geben, um Durchfälle zu verhüten.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Nicht zutreffend.

10. WARTEZEIT(EN)

Keine.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C - 25°C).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Keine.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

26.01.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Packungen: Faltschachtel à 4 Beutel zu je 100 g

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Swissmedic 35767

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.