

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Arthri-Dog® ad us. vet., compresse per cani

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Vetoquinol AG
Freiburgstrasse 255
3018 Berna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Francia

DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Arthri-Dog® ad us. vet., compresse per cani

PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

Principi attivi:

Fenilbutazone calcica	100 mg
Prednisolone acetato	2 mg
Vitamina C	100 mg

Compresse bianche, convesse

INDICAZIONE(I)

- Infiammazione delle articolazioni e sintomi dolorosi di accompagnamento
- Tendinite
- Reumatismi articolari e muscolari
- Malattie degenerative della colonna vertebrale
- Infiammazione a seguito di lesioni

CONTROINDICAZIONI

Gravi malattie cardiache, epatiche o renali, ulcere gastrointestinali, composizione errata del sangue, malattie infettive.

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o altro eccipiente.

EFFETTI COLLATERALI

Disturbi del tratto gastrointestinale, ulcere del tratto gastrointestinale, compromissione della funzione renale e della formazione del sangue.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione orale.

Una compressa al giorno per 5 - 10 kg di peso corporeo.

Cani grandi: 4 - 6 compresse al giorno in 2 - 3 dosi

Cani di taglia media: 2 - 4 compresse al giorno in 2 - 3 dosi

Piccoli cani: 1 - 2 compresse al giorno in 1 - 2 dosi

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

In ogni caso, il dosaggio deve essere specificamente adattato alla malattia e alla reazione al trattamento. Se c'è un miglioramento visibile dopo 3 - 4 giorni, la dose può essere ridotta.

TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

AVVERTENZE SPECIALI

Gravidanza:

Non usare l'ultimo trimestre della gravidanza.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Il fenilbutazone può influenzare (aumentare o diminuire) l'effetto di altri farmaci.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

In caso di un notevole sovradosaggio, possono verificarsi eccitazione o crampi e sanguinamento nelle urine. Come contromisura, il preparato deve essere immediatamente interrotto e un trattamento deve essere effettuato in accordo con il veterinario.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE
NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

25.06.2020

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

Confezioni:

Scatola con 40 compresse in blister alluminio/PVC

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 36'613

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.