

Eutrawest

ad us. vet.

Émulsion, Indurations des pis chez la vache

Composition

Dextrocamphora	20 mg
Methylis salicylas	5 mg
Cineolum	2 mg
Guaiacolum	5 mg

Conserv.: E 217, E 219

Color.: E 110, E 122

Excipients ad emulsionem pro 1 g

Propriétés/Effets

Eutrawest est facilement résorbé, agit par voie externe comme analgésique, antiphlogistique, adoucissant et antiprurigineux et possède une action antiseptique prononcée.

Indications

Indurations des pis. Traitement local d'appoint dans les infections des pis.

Posologie/Mode d'emploi

Nettoyer à sec le pis avant la traite avec une brosse, un papier, un tissu, une fibre de bois ou de la paille. Appliquer abondamment Eutrawest après la traite et faire soigneusement pénétrer par massage. Traiter deux fois par jour.

Délai d'attente: aucun

Remarques particulières

Agiter le flacon avant l'emploi.

A conserver à température ambiante (15°-25°C) et hors de la portée des enfants.

Présentation

Flacons en plastique de 250 g et 1000 g

ATCvet Code: QG52C

Swissmedic 39'381 (B)

Mise à jour de l'information

Juillet 2008

Titulaire de l'autorisation
Werner Stricker SA
Münchenbuchsee
Domicile: Zollikofen

Eutrawest

ad us. vet.

Émulsion, Indurations des pis chez la vache

Composition

Dextrocamphora	20 mg
Methylis salicylas	5 mg
Cineolum	2 mg
Guaiacolum	5 mg

Conserv.: E 217, E 219

Color.: E 110, E 122

Excipients ad emulsionem pro 1 g

Propriétés/Effets

Eutrawest est facilement résorbé, agit par voie externe comme analgésique, antiphlogistique, adoucissant et antiprurigineux et possède une action antiseptique prononcée.

Indications

Indurations des pis. Traitement local d'appoint dans les infections des pis.

Posologie/Mode d'emploi

Nettoyer à sec le pis avant la traite avec une brosse, un papier, un tissu, une fibre de bois ou de la paille. Appliquer abondamment Eutrawest après la traite et faire soigneusement pénétrer par massage. Traiter deux fois par jour.

Délai d'attente: aucun

Remarques particulières

Agiter le flacon avant l'emploi.

A conserver à température ambiante (15°-25°C) et hors de la portée des enfants.

Présentation

Flacons en plastique de 250 g et 1000 g

ATCvet Code: QG52C

Swissmedic 39'381 (B)

Mise à jour de l'information

Juillet 2008

Titulaire de l'autorisation
Werner Stricker SA
Münchenbuchsee
Domicile: Zollikofen

Eutrawest

ad us. vet.

Émulsion, Indurations des pis chez la vache

Composition

Dextrocamphora	20 mg
Methylis salicylas	5 mg
Cineolum	2 mg
Guaiacolum	5 mg

Conserv.: E 217, E 219

Color.: E 110, E 122

Excipients ad emulsionem pro 1 g

Propriétés/Effets

Eutrawest est facilement résorbé, agit par voie externe comme analgésique, antiphlogistique, adoucissant et antiprurigineux et possède une action antiseptique prononcée.

Indications

Indurations des pis. Traitement local d'appoint dans les infections des pis.

Posologie/Mode d'emploi

Nettoyer à sec le pis avant la traite avec une brosse, un papier, un tissu, une fibre de bois ou de la paille. Appliquer abondamment Eutrawest après la traite et faire soigneusement pénétrer par massage. Traiter deux fois par jour.

Délai d'attente: aucun

Remarques particulières

Agiter le flacon avant l'emploi.

A conserver à température ambiante (15°-25°C) et hors de la portée des enfants.

Présentation

Flacons en plastique de 250 g et 1000 g

ATCvet Code: QG52C

Swissmedic 39'381 (B)

Mise à jour de l'information

Juillet 2008

Titulaire de l'autorisation
Werner Stricker SA
Münchenbuchsee
Domicile: Zollikofen

Eutrawest

ad us. vet.

Émulsion, Indurations des pis chez la vache

Composition

Dextrocamphora	20 mg
Methylis salicylas	5 mg
Cineolum	2 mg
Guaiacolum	5 mg

Conserv.: E 217, E 219

Color.: E 110, E 122

Excipients ad emulsionem pro 1 g

Propriétés/Effets

Eutrawest est facilement résorbé, agit par voie externe comme analgésique, antiphlogistique, adoucissant et antiprurigineux et possède une action antiseptique prononcée.

Indications

Indurations des pis. Traitement local d'appoint dans les infections des pis.

Posologie/Mode d'emploi

Nettoyer à sec le pis avant la traite avec une brosse, un papier, un tissu, une fibre de bois ou de la paille. Appliquer abondamment Eutrawest après la traite et faire soigneusement pénétrer par massage. Traiter deux fois par jour.

Délai d'attente: aucun

Remarques particulières

Agiter le flacon avant l'emploi.

A conserver à température ambiante (15°-25°C) et hors de la portée des enfants.

Présentation

Flacons en plastique de 250 g et 1000 g

ATCvet Code: QG52C

Swissmedic 39'381 (B)

Mise à jour de l'information

Juillet 2008

Titulaire de l'autorisation
Werner Stricker SA
Münchenbuchsee
Domicile: Zollikofen