

# Calcamyl®-24MP ad us. vet.

Infusionslösung mit Ca, Mg und P für Pferd und Rind

## Zusammensetzung

Calcium 18 mg ut Calcii gluconas et Calcii borogluconas, Magnesium 5.5 mg et Phosphorus 14.2 mg ut Magnesii hypophosphis hexahydricus,  
Conserv.: E216 0.1 mg, E218 0.9 mg  
Aqua ad iniectionabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml

## Eigenschaften / Wirkungen

Calcamyl-24MP enthält in ausgewogener Zusammensetzung die Mineralstoffe Calcium, Magnesium und Phosphor, welche für verschiedene biologische Vorgänge, wie z. B. Muskelkontraktionen, nervöse Erregungsleitung, Enzymreaktionen etc. lebensnotwendig sind. Calcium besitzt einen stabilisierenden Effekt auf Membranen; es wirkt einer erhöhten Gefässpermeabilität entgegen. Zudem hat Calcium antiphlogistische und antiallergische Eigenschaften. Calciummangel führt bei der Milchkuh zu Krankheiten wie lebensbedrohlicher hypocalcämischer Gebärdparese (Festliegen), fortschreitender Muskellähmung, Kreislaufschwäche. Hypomagnesiämische Zustände können ebenfalls Festliegen verursachen. Ein Abfall des Phosphatspiegels im Blut kann zu einem verminderten Ansprechen auf eine Calciumtherapie führen.

## Indikationen

Festliegen, Stall- und Weidetetanie

## Dosierung / Anwendung

Pferd, Rind, langsam intravenös:	schwere Rassen:	300 - 500 ml
	leichte Rassen:	200 - 300 ml
Rind, subkutan auf mehrere Stellen verteilt:		100 - 200 ml

## Anwendungseinschränkungen

### Kontraindikationen

Schwere Niereninsuffizienz, Hypercalcämie

### Vorsichtsmassnahmen

Wie bei allen Calcium-Infusionen ist eine Herzkontrolle empfohlen.

## Unerwünschte Wirkungen

Zu schnelle Infusion kann zu allergischen Erscheinungen führen. Eventuell auftretende Gewebeschwellungen klingen nach einigen Tagen wieder ab.

## Absetzfrist

Keine

## Wechselwirkungen

Calcium-Ionen und Herzglycoside wirken synergistisch. Dieser Effekt kann zu einem Herzstillstand führen.

## Sonstige Hinweise

Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Aufbrauchfrist nach erster Entnahme: 28 Tage. Medikament ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15 - 25°C) aufbewahren.

## Packungen

Infusionsflasche zu 500 ml

**ZulassungsinhaberIn**  
Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic: 39'931 (B)  
ATCvet-Code: QA12AX

Stand der Information: Juni 2005