

Ferridex ad us. vet., Solution injectable

Anémies de fer chez les porcs, porcelets et veaux

Composition

Ferrum 100 mg

(ut Ferri hydroxidum/Dextranum)

Conserv.: Phenolum 5 mg

Aqua ad injectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml

Propriétés/Effets

La solution aqueuse de dextrans de fer est particulièrement efficace pour traiter les anémies par carence en fer survenant fréquemment chez le porcelet et le veau. Le fer est facilement résorbé et très rapidement utilisé par le tissu hématopoïétique. La réserve en fer est suffisamment saturée par une injection prophylactique, de sorte qu'une injection couvre normalement les besoins vitaux en fer sur une longue période.

Indications

Prophylaxie et traitement des anémies, particulièrement chez les porcelets et les veaux.

Posologie/Mode d'emploi

| | | |
|---------------------|---------------|---|
| Porcelets | en prévention | 1,5 à 2 ml i.m., les 3e et 4e jour de vie |
| | en traitement | 2 ml i.m., entre le 7e et le 21e jour de vie le diagnostic d'anémie par carence en fer ayant été posé; en cas de besoin, répéter au bout d'une semaine. |
| Truies en gestation | | 5 ml i.m., 14 jours avant la mise bas |
| Veaux | | 4 ml i.m., dans les 2 premières semaines de vie |

Ferridex est injecté en intramusculaire, dans la musculature de la cuisse chez les porcelets et dans la musculature postérieure du cou près de la naissance de la tête chez les veaux.

Effets indésirables

L'injection de fer dextran peut provoquer des réactions anaphylactoïdes ou anaphylactiques chez les porcelets. Ceci a en particulier été observé chez les porcelets nouveau-nés présentant une carence en vitamine E / sélénium.

Délai d'attente

Aucun

Remarques particulières

Ne pas mélanger avec d'autres préparations dans la même seringue.

N'utiliser que des seringues et des aiguilles bien propres.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte

Durée d'utilisation une fois le flacon entamé: 1 semaine.

Tenir hors de portée des enfants ! Conserver à température ambiante (15 - 25°C). Durée d'utilisation une fois le flacon entamé: 1 semaine

Présentations

Solution injectable en flacons de 100 ml.

Swissmedic-No. 40'652 (B)

ATCvet-Code: QB03AC01

Mise à jour de l'information

Décembre 2019

Titulaire de l'autorisation

Werner Stricker SA

Münchenbuchsee

Domicile : Zollikofen