

PACKUNGSBEILAGE

Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet., Antibiotikum-Spray für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Biokema SA,
Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet., Antibiotikum-Spray für Tiere

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Spraydose zu 200 ml enthält:

Wirkstoff:

Chlortetracyclin hydrochlorid 5 g (entsprechend 4,65 g Chlortetracyclin)

Sonstiger Bestandteil:

Beta Carotin (E 160a)

Orange Suspension

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von lokalen, oberflächlichen Wundinfektionen von Tieren.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil..

6. NEBENWIRKUNGEN

Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Produkt können auftreten.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Für Tiere

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Direkt in die Wunde sprühen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln!

10. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: 0 Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Extrem entzündbares Aerosol.

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis auf dem Dosenboden angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Bei Anwendung im Kopfbereich Augen schützen. Bei laktierenden Tieren, deren Milch für die Lebensmittelgewinnung verwendet wird, nicht in der Nähe von Euter/Zitzen anwenden. Nötigenfalls Euter abdecken.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender: Sprühnebel nicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten sofort mit reichlich Wasser spülen. Personen mit bekannter Tetracyclin-Überempfindlichkeit sollten den Umgang mit dem Arzneimittel meiden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: Da Chlortetracyclin bakteriostatisch wirkt, sollten wegen möglicher Verminderung der Wirksamkeit nicht gleichzeitig bakterizid wirkende Antibiotika verabreicht werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

24.07.2019

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Aerosoldose zu 200 ml

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 40'824

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.