

Information für Tierhaltende

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Dexavetaderm ad us. vet., Emulsion für Hunde und Katzen

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dexavetaderm ad us. vet., Emulsion für Hunde und Katzen

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Emulsion enthält:

Wirkstoffe:

Dexamethasonacetat 0,17 mg

Neomycin (als N. sulfat) 8,40 mg

Sonstiger Bestandteil:

Benzylalkohol 21 mg

Weisslich-elfenbeinfarbige Emulsion zur Anwendung auf der Haut

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Entzündliche bakterielle Hautinfektionen und allergische Hautentzündungen

Lecksuchtekmeme, Schürfstellen von Verbänden, Verbrennungen ersten Grades, Salzreize im Winter.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht grossflächig anwenden.

Nicht anwenden bei:

- Überempfindlichkeit oder Resistenz gegen das Antibiotikum Neomycin oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe,
- bei eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion,
- bei Störungen des Gehör- und Gleichgewichtssinns,

- bei Erkrankungen der Haut aufgrund von Befall mit Parasitären, Viren oder Pilzen.
Nicht bei trächtigen Tieren anwenden.

6. NEBENWIRKUNGEN

Die Anwendung von Dexavetaderm kann zu einer Überempfindlichkeit führen, die sich als Entzündung der Haut zeigt; eine längerdauernde, intensive Anwendung kann zu Nebenwirkungen der Kortikoide führen, wie ein Dünnenwerden der Haut und verzögerte Wundheilung.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur Anwendung auf der Haut. Vor Gebrauch gut schütteln.

Hunde und Katzen:

2 bis 3mal täglich auf die erkrankten Hautpartien auftragen
oder 1mal wöchentlich zur unterstützend zur Therapie.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Schutzhandschuhe tragen.

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Nach ungewolltem Kontakt unter fließendem Wasser abwaschen.

Nach der Anwendung Hände waschen.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Keine.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

21.06.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Tube à 50 g oder à 200 g

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 43'202

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.