

## Informazione per i detentori di animali

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Dexavetaderm ad us. vet., emulsione per cani e gatti

#### 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Biokema SA,  
Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, [hotline@biokema.ch](mailto:hotline@biokema.ch).

#### 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dexavetaderm ad us. vet., emulsione per cani e gatti

#### 3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 g di emulsione contiene:

##### Principi attivi:

Desametasone acetato 0,17 mg

Neomicina (come n. solfato) 8,40 mg

##### Eccipiente:

Alcool benzilico 21 mg

Emulsione di colore biancastro-avorio da applicare sulla pelle

#### 4. INDICAZIONE(I)

Infezioni infiammatorie della pelle di tipo batterico e infiammazioni della pelle di tipo allergico, eczemi da leccamento, zone escoriate di bendaggi, ustioni di primo grado, irritazioni da sale in inverno.

#### 5. CONTROINDICAZIONI

Non applicare su aree estese.

Non usare in caso di:

- ipersensibilità o resistenza all'antibiotico neomicina o ad uno degli altri ingredienti,
- ridotta funzionalità dei reni e del fegato,
- disturbi dell'udito e dell'equilibrio,
- malattie della pelle causate da un'infestazione di parassiti, virus o funghi.

Non usare negli animali in gravidanza.

## **6. EFFETTI COLLATERALI**

L'uso di Dexavetaderm può causare ipersensibilità, che si manifesta come infiammazione della pelle; l'uso prolungato ed intensivo può causare effetti collaterali associati ai corticoidi, come assottigliamento della pelle e ritardata guarigione delle ferite.

## **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani e gatti.

## **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Da applicare sulla pelle. Agitare bene prima dell'uso.

Cani e gatti:

Applicare sulle parti di pelle malata 2-3 volte al giorno oppure 1 volta alla settimana come supporto alla terapia.

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Indossare guanti di protezione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

In seguito al contatto accidentale, sciacquare con acqua corrente.

Lavare le mani dopo l'uso.

## **10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C - 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

Nessuna.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

**14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

21.06.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

**15. ALTRE INFORMAZIONI**

Tubo da 50 g o da 200 g

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 43'202

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.