

Calcamyl®-40MP ad us. vet.

Solution pour perfusion avec Ca, Mg et P pour bovins

Composition

Calcium 31.3 mg ut Calcii gluconas et Calcii borogluconas
Magnesium 5.5 mg et Phosphorus 14.2 mg ut Magnesii hypophosphis hexahydricus
Conserv.: E 216 0.1 mg, E 218 0.9 mg
Aqua ad iniectionabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml

Propriétés / Effets

Calcamyl-40MP contient du calcium, du magnésium et du phosphore en proportions équilibrées. Ces minéraux jouent un rôle vital dans divers processus biologiques, comme par exemple les contractions musculaires, l'influx nerveux, les réactions enzymatiques, etc. Le calcium a un effet stabilisateur sur les membranes et empêche une hyperperméabilité vasculaire. De plus, le calcium possède des propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques. Un manque de calcium induit chez la vache laitière des affections telles qu'une parésie de parturition engageant le pronostic vital, une paralysie musculaire progressive, et une faiblesse circulatoire. Une carence en magnésium peut également provoquer une parésie. Une hypophosphatémie peut diminuer les effets d'une calcithérapie.

Indications

Bovins: parésies de parturition, tétanies d'étable et d'herbage

Posologie / Mode d'emploi

Bovins, par voie intraveineuse lente: 50 ml par 100 kg PC
Bovins, par voie sous-cutanée, répartis sur plusieurs sites d'injection: 100 - 200 ml

Limitations d'emploi

Contre-indications

Insuffisance rénale sévère, hypercalcémie

Précautions

Comme pour toutes les perfusions de calcium, un contrôle cardiaque est vivement recommandé.

Effets indésirables

Une perfusion trop rapide peut provoquer des réactions allergiques. Des tuméfactions tissulaires éventuelles régressent en quelques jours.

Délai d'attente

Aucun

Interactions

Les ions calciques et les glucosides cardiotoniques agissent de façon synergique. Cet effet peut provoquer un arrêt cardiaque.

Remarques particulières

La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 28 jours. Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15 - 25°C).

Présentation

Flacon pour perfusion de 500 ml

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeb AG, Berne

Swissmedic: 43'498 (B)

ATCvet-Code: QA12AX

Mise à jour de l'information: juin 2005

The logo for Graeb AG, featuring the word "graeb" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black, and the "g" and "b" have a slight shadow or outline effect. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.