

Calcitat® S 50 ad us. vet.

Ca-Injektionslösung für Rind, Kalb, Schaf, Ziege, Schwein, Ferkel, Hund und Katze

Zusammensetzung

100 ml wässrige Lösung enthalten:

3.10 g	Calcii gluconas	}	entspr. 4.56 g Ca
42.90 g	Calcii borogluconas		
1.32 g	Calcii hydroxidum		
6.50 g	Magnesii chloridum hexahydricum		entspr. 0.78 g Mg
0.60 g	Aminoethylis dihydrogenophosphas		entspr. 0.132 g P
2.24 g	Macrogolum 200		

Conserv: E 218 0.1 g

Aqua ad inieciabilia

Eigenschaften / Wirkungen

Calcitat S 50 ist eine wässrige, pyrogenfreie Ca-Mg-Phosphorlösung zur Infusion/Injektion bei Gebärparesen, Festliegen, Geburtstetanie (Eklampsie) und Allergien.

Indikationen

Rind, Schaf, Ziege:	Gebärparesen, Festliegen
Mutterschwein:	Geburtstetanie (Eklampsie)
Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze:	Allergien

Dosierung / Anwendung

Rind:	1. Akute Calciummangelzustände, hypocalcämische Gebärparesen: 200 bis 220 ml/500 kg KGW 2. Zur Begleittherapie von Allergien: 100 bis 150 ml/500 kg KGW
Kalb, Schaf, Ziege, Schwein:	15 ml / 50 kg KGW
Ferkel:	1.5 ml / 5 kg KGW
Hund:	2 ml / 10 kg KGW
Katze:	0.5 ml / 2.5 kg KGW

Eine Behandlung ist in der Regel ausreichend, nur in Sonderfällen ist eine 2. Infusion erforderlich.

Anwendung

Langsame intravenöse Infusion der körperwarmen Lösung. Die Infusionsdauer soll mindestens 5 Minuten betragen.

Für die Behandlung akuter Calciummangelzustände und der hypocalcämischen Gebärparesen ist die Lösung intravenös bzw. fraktioniert intravenös und subkutan zu applizieren. Intramuskuläre und subkutane Injektion: Bei der intramuskulären und subkutanen Verabreichung grösserer Injektionsvolumina sind diese auf mehrere Injektionsstellen zu verteilen.

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen

Hypercalcämie, Hyperparathyreoidismus, Acidose, schwere Nierenschädigungen

Vorsichtsmassnahmen

Eine erste Nachbehandlung darf frühestens nach 6 Stunden vorgenommen werden. Weitere Nachbehandlungen nach 24 Stunden, wenn sichergestellt ist, dass das Anhalten der Symptome auf einen weiterhin bestehenden hypocalcämischen Zustand zurückzuführen ist.

Unerwünschte Wirkungen

An der Injektionsstelle kann es lokal zu Irritationen kommen.

Absetzfrist

Keine

Wechselwirkungen

Calciumsalze erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber Herzglykosiden und sollen deshalb nicht bei digitalisierten Patienten angewendet werden. Aufgrund der Unverträglichkeit von Calciumsalzen mit vielen Substanzen sind Zumischungen zu vermeiden.

Sonstige Hinweise

Calcitat S 50 nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Calcitat S 50 für Kinder unzugänglich aufbewahren. Aufbrauchfrist nach Entnahme der ersten Dosis: 28 Tage

Lagerungshinweis

Nicht über 25°C lagern.

Packungen

Flasche mit 100 ml
Flasche mit 250 ml

Swissmedic 44'541 (B)
ATCvet-Code: QA12AX

Zulassungsinhaber

Dr. E. Graeub AG, Bern

Stand der Information: November 2006

19V004.1307

graeub