

Bifundin ad us. vet.

Solution pour perfusion pour cheval, bovin, porc, mouton et chèvre

Composition

100 ml de solution pour perfusion contiennent:

Glucosum monohydricum	15 g
Fructosum	5 g
Thiaini hydrochloridum	0.05 g
Conserv.: E 216 10 mg, E 218 90 mg	
Propylenglycolum, Aqua ad iniectabilia ad 100 ml	

Indications

Thérapie de soutien lors d'hypoglycémie, intoxications, acétonémie, affections hépatiques

Posologie / Mode d'emploi

Cheval, bovin, porc, mouton et chèvre: 200 à 500 ml i.v.

Délai d'attente

Aucun

Remarques particulières

Conserver à température ambiante (15 - 25°C). La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 28 jours. Tenir hors de portée des enfants.

Présentation

Flacon pour perfusion de 500 ml

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Swissmedic 45'597 (B)
ATCvet-Code QB05BA10

Mise à jour de l'information: 06.2003

The logo for Graeub, featuring the word "graeub" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black, and the "g" and "b" have a distinctive shape. A thick, black, curved line arches over the letters, starting under the "g" and ending under the "b", creating a stylized underline or swoosh effect.