

ad us. vet.

# NEO-M<sup>®</sup>-SALBE FORTE

Salbe in Injektoren  
Mastitispräparat für Kühe  
Pommade en injecteurs  
Préparation intramammaire  
pour vaches

Benzylpenicillinum  
procainum, Neomycinum,  
Retinoli palmitas



**100 x 20 g**

**de fr** Zusammensetzung | Composition  
Benzylpenicillinum procainum 2 Mio. UI,  
Neomycinum 700 mg ut Neomycini sulfas,  
Retinoli palmitas 20'000 UI, Paraffinum  
liquidum, Vaselinum album, Alcoholes adipis  
lanae, Alcoholes cetylicus et stearylicus,  
Conserv.: E 216 30 mg, E 218 70 mg,  
pro vase 20 g

**de** Indikationen  
Zur Therapie von Mastitiden, verursacht durch  
Penicillin/Neomycin empfindliche Keime:  
Streptokokken, Gelb-Galt-Streptokokken,  
Staphylokokken, Mikrokokken, *E. coli*,  
*Actinomyces pyogenes*

**Dosierung / Anwendung**  
Dreimal im Abstand von 12 Stunden je einen  
Injektor in jedes erkrankte Viertel infundieren.  
Vorher gründlich ausmelken, um krankhaftes  
Eutersekret möglichst restlos zu entfernen.  
Zitzenkuppe desinfizieren. Injektoransatz  
sauber in den Strichkanal einführen. Nach  
Infusion Euter leicht massieren.

**Absetzfristen**  
Rind: Milch, essbare Gewebe: 5 Tage

**Sonstige Hinweise**  
Im Kühlschrank bei 2 - 8°C lagern. Medika-  
ment ausser Reichweite von Kindern  
aufbewahren. Nur bis zum mit «EXP.»  
bezeichneten Datum verwenden.

**Packungen:** 3 und 100 Injektoren  
Stand der Information 12.2008

**fr** Indications  
Traitement des mammites dues à des micro-  
organismes sensibles à la pénicilline/néo-  
mycine : streptocoques, *S. agalactiae*,  
staphylocoques, microcoques, *E. coli*,  
*Actinomyces pyogenes*

**Posologie / Mode d'emploi**  
Administrieren le contenu d'un injecteur dans  
chaque quartier malade, trois fois à 12 heures  
d'intervalle. Auparavant, traire complètement  
afin d'éliminer toutes les sécrétions patholo-  
giques. Désinfecter le bout du trayon.  
Introduire soigneusement l'embout de  
l'injecteur dans le canal du trayon. Après  
administration, masser légèrement la  
mamelle.

**Délais d'attente**  
Bovin : lait, tissus comestibles : 5 jours

**Remarques particulières**  
Conservieren au réfrigérateur entre 2 et 8°C.  
Tenir hors de portée des enfants. Utiliser  
avant la date indiquée avec «EXP.».

**Présentations :** 3 et 100 injecteurs  
Mise à jour de l'information 12.2008

**de fr** Zulassungsinhaber | Titulaire de  
l'autorisation  
Dr. E. Graeub AG, Bern  
Swissmedic 45'983'050  
ATCvet-Code: QJ51RC23

