

PREVOTEC® ad us. vet.

Siringa intramammaria per vacche Benzilpenicillina, Neomicina, Retinolpalmitato

Foglietto illustrativo

Informazioni per i detentori di animali

Informazione professionale per il personale medico vedi www.tierarzneimittel.ch

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi Titolare dell'autorizzazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. E. Graeb AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

2. Denominazione del medicinale veterinario

Prevotec ad us. vet., siringa intramammaria per vacche

3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 siringa da 10 g di pomata contiene:

Principi attivi:

Benzilpenicillina procaina	500'000 U.I.
Benzilpenicillina benzatina	500'000 U.I.
Neomicina (sotto forma di neomicina solfato)	700 mg
Retinolpalmitato	100'000 U.I.

Eccipienti:

p-Idrossibenzoato di metile (E218)	35 mg
p-Idrossibenzoato di propile	15 mg
Pomata giallastra, lubrificante e dall'odore leggero, per applicazione intramammaria	

4. Indicazioni

Protezione delle mammelle delle vacche durante il periodo di asciutta

Per il trattamento e la prevenzione delle infiammazione alle mammelle durante il periodo di asciutta delle vacche

5. Controindicazioni

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

Non utilizzare su animali in lattazione.

6. Reazioni avverse

Non note

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. Specie di destinazione

Vacca

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Utilizzare 1 siringa per ogni quarto.

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Svuotare bene le mammelle. Pulire a fondo i capezzoli con una salviettina disinfettante. Iniettare il contenuto di una siringa in ogni quarto. Dopo il trattamento, non mungere più.

10. Tempi di attesa

Latte:

Questo preparato è riservato al trattamento delle mammelle durante il passaggio all'asciutta o nel periodo di asciutta. In caso di un periodo di asciutta inferiore a 8 settimane, prima della commercializzazione occorre verificare che il latte sia privo di inibitori.

Tessuti commestibili:

Qualora durante il periodo di asciutta un animale venga abbattuto, i tessuti commestibili dovranno essere sottoposti a controllo degli inibitori.

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in frigorifero (2 - 8 °C).

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

12. Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il farmaco deve essere utilizzato solo dopo test di sensibilità.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Evitare il contatto diretto con la pelle o le mucose dell'utilizzatore per il rischio di sensibilizzazione.

Gravidanza ed allattamento:

Può essere usato durante la gravidanza.

Questo medicinale veterinario non deve essere somministrato durante la lattazione.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Le penicilline non devono essere combinate con antibiotici ad azione batteriostatica in quanto agiscono solo contro germi in fase di sviluppo.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

13.08.2020

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. Altre informazioni

4 siringhe in plastica da 10 g con 2 salviettine disinfettanti in scatola

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 46'637

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.