

## INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Synulox 50 mg ad us. vet., compresse per cani e gatti

Synulox 250 mg / 500 mg ad us. vet., compresse per cani

## 1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Zoetis Schweiz GmbH  
Rue de la Jeunesse 2  
2800 Delémont

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Haupt Pharma Latina S.r.L.  
S.S. 156 Km 47.600  
04100 Borgo San Michele  
Italia

## 2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Synulox 50 mg ad us. vet., compresse per cani e gatti

Synulox 250 mg / 500 mg ad us. vet., compresse per cani

## 3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

### Principi attivi:

	50 mg	250 mg	500 mg
Amoxicillina			
(sotto forma di amoxicillina triidrato)	40 mg	200 mg	400 mg
Acido clavulanico			
(sotto forma di clavulanato di potassio)	10 mg	50 mg	100 mg

**Forma farmaceutica:**

Compresse.

Compresa piatta, rotonda, con chiazze rosa, con linea di frattura su un lato e la scritta "Synulox" impressa sull'altro lato.

#### **4 INDICAZIONE(I)**

Antibiotico per cani e gatti.

Infezioni batteriche nel cane e nel gatto, in particolare: infiammazioni purulente della cute superficiali e profonde, infezioni del tratto urinario e genitale, del tratto digerente, del tratto respiratorio e infezioni causate da batteri che non hanno bisogno di ossigeno.

#### **5 CONTROINDICAZIONI**

- Non usare in casi di nota ipersensibilità alle penicilline, a sostanze simili alla penicillina o a uno degli eccipienti.
  - Non usare in animali con gravi disturbi della funzionalità renale con produzione insufficiente di urine.
  - Synulox non deve essere somministrato a conigli, cavie, criceti e gerbilli.
- Anche con altri erbivori molto piccoli è richiesta molta cautela.
- Non usare in caso di resistenza alle penicilline.

#### **6 EFFETTI COLLATERALI**

Reazioni allergiche (reazioni cutanee fino ad allergie potenzialmente fatali). In caso di reazione allergica è necessario interrompere immediatamente l'uso del farmaco veterinario e il veterinario deve adottare misure appropriate.

Non comunemente, dopo la somministrazione del prodotto possono manifestarsi disturbi digestivi (vomito, diarrea, mancanza di appetito).

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1'000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10'000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10'000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

## **7 SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani e gatti.

## **8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso orale.

### **Posologia:**

12.5 mg/kg p.c. due volte al giorno (cfr. tabella nella rubrica «9. Avvertenze per una corretta somministrazione»). Nei casi d'infezioni persistenti, in particolare nelle infezioni delle vie respiratorie, la posologia può essere aumentata a 25 mg/kg p.c. due volte al giorno.

### **Durata del trattamento:**

In genere da 5 a 7 giorni.

In caso di gravi danni dei tessuti e nei casi cronici, secondo indicazione:

infiammazione purulenta della cute 10 - 30 giorni,

cistite 10 - 28 giorni,

polmonite 8 - 10 giorni.

## 9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le compresse possono essere somministrate intere o frantumate, con un po' di cibo.

Grazie al sapore aromatizzato, le compresse vengono assunte volentieri.

Peso corporeo (kg)	Numero di compresse per trattamento (due trattamenti al giorno)		
	Synulox 50 mg	Synulox 250 mg	Synulox 500 mg
1 – 2	½	-	-
3 – 5	1	-	-
6 – 9	2	-	-
10 – 13	3	-	-
14 – 18	4	-	-
19 – 25	-	1	½
26 – 35	-	1 ½	-
36 - 50	-	2	1
> 50	-	3	1 ½

## 10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## 11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15 - 25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini!

Il prodotto non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "Exp" sulla confezione.

## 12 AVVERTENZE SPECIALI

### ***Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:***

L'uso del farmaco veterinario deve essere basato su test di sensibilità effettuati dal veterinario, osservando le disposizioni ufficiali e locali sull'uso degli antibiotici.

L'uso inappropriato del farmaco veterinario può portare a un aumento dei batteri resistenti e a una riduzione dell'efficacia.

Prestare attenzione a possibili allergie crociate con altre sostanze simili (derivati della penicillina e cefalosporine).

Negli animali con compromissione epatica o renale, la posologia deve essere valutata con cura e l'uso richiede sempre una valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile.

Poiché il medicinale veterinario è aromatizzato, sussiste il rischio che cani e gatti cerchino con golosità le compresse e ne assumano una quantità eccessiva. Pertanto, il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata degli animali.

***Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il farmaco veterinario agli animali:***

Penicilline e cefalosporine possono causare reazioni allergiche dopo iniezione, inalazione, ingestione o contatto con la cute.

L'ipersensibilità alle penicilline può portare a reazioni crociate nei confronti di antibiotici simili (cefalosporine) e viceversa. Queste reazioni allergiche possono essere potenzialmente fatali.

Le persone con ipersensibilità nota e le persone alle quali è stato consigliato di evitare contatti con il principio attivo non devono manipolare questo medicinale veterinario.

Questo medicinale veterinario deve essere manipolato con grande cautela, osservando tutte le misure precauzionali raccomandate per evitare l'esposizione.

Alla comparsa di sintomi, come ad es. eruzione cutanea, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo. Un gonfiore del viso, delle labbra o degli occhi e i disturbi respiratori sono sintomi seri che richiedono un trattamento medico urgente.

Lavarsi le mani dopo l'uso.

***Gravidanza e allattamento:***

Usare il medicinale veterinario durante la gravidanza o l'allattamento solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario responsabile.

***Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:***

Non usare in combinazione con antibiotici che inibiscono la crescita batterica.

***Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):***

Se dopo un sovradosaggio si manifestano reazioni allergiche, sintomi di eccitazione o convulsioni, è necessario interrompere immediatamente il trattamento e contattare il veterinario che adotterà subito le misure appropriate.

***Incompatibilità:***

Non pertinente.

### **13        PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL               PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE               NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.  
Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di  
cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14        DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

31.08.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e  
[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15        ALTRE INFORMAZIONI**

Synulox 50 mg: scatola pieghevole con 10 blister di alluminio da 10 compresse  
Synulox 250 mg: scatola pieghevole con 10 blister di alluminio da 10 compresse  
Synulox 500 mg: scatola pieghevole con 50 blister di alluminio da 2 compresse  
Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria  
Swissmedic 46943

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare  
dell'omologazione indicato nella sezione 1.