

MILIOPEN[®] ad us. vet.

Siringa intramammaria per vacche Benzylpenicillinum

it Foglietto illustrativo

Informazione per i detentori di animali

Informazione professionale per il personale medico vedi www.tierarzneimittel.ch

1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

Titolare dell'omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. E. Graeb AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

2. Denominazione del medicamento veterinario

Milopen ad us. vet., siringa intramammaria per vacche

3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 siringa da 20 g contiene:

Principio attivo:

Benzilpenicillina procaina 3 mio U.I.

Eccipienti:

p-idrossibenzoato di metile (E248) 70 mg

p-idrossibenzoato di propile 30 mg

Sospensione bianca e fluida, con odore debole per uso intramammario

4. Indicazioni

Preparazione per la mastite delle vacche

Terapia e profilassi della mastite causata da germi sensibili alla penicillina come: Streptococchi, *S. agalactiae*, micrococchi, stafilococchi (in parte) e *Actinomyces pyogenes*

5. Controindicazioni

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

6. Effetti collaterali

Possono verificarsi reazioni allergiche (reazioni allergiche cutanee, shock anafilattico).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario.

7. Specie di destinazione

Vacca

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Infondere tre volte a intervalli di 12 ore il contenuto di una siringa in ogni quarto malato.

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Dapprima mungere a fondo per rimuovere il più possibile le secrezioni patologiche della mammella. Disinfettare la punta del capezzolo. Introdurre l'attacco sterile della siringa nel dotto papillare. Dopo l'infusione, massaggiare delicatamente la mammella.

10. Tempi di attesa

Latte:	7 giorni
Tessuti commestibili ad eccezione del fegato:	5 giorni
Fegato:	10 giorni

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

12. Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il farmaco dovrebbe essere per quanto possibile utilizzato solo dopo test di sensibilità

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Evitare il contatto diretto con la pelle o le mucose dell'utilizzatore per il rischio di sensibilizzazione.

Gravidanza ed allattamento:

Può essere usato durante la gravidanza e la lattazione.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Le penicilline non devono essere combinate con antibiotici che inibiscono la crescita e la moltiplicazione dei batteri, in quanto sono efficaci solo contro i germi in crescita.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

02.02.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. Altre informazioni

3 o 100 siringhe in plastica da 20 g in scatola

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 47'709

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.