

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Karsivan® 50 ad us. vet., compresse rivestite con film per cani

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

Propentofyllinum 50 mg

Eccipienti:

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere la rubrica 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compressa rivestita con film biconvessa, rotonda, di colore oca con linea di frattura in quattro parti su un lato e con impresso "K50" sull'altro lato. Le compresse hanno una linea di frattura la cui idoneità al dimezzamento o quartato è stata dimostrata.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cane

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Disturbi legati all'età nel cane (disturbi della circolazione sanguigna cerebrale e periferica).

4.3 Controindicazioni

Nessuna.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

In caso di significativa riduzione della funzionalità renale, la dose deve essere diminuita.

Avvertenza: malattie specifiche (ad es. insufficienza cardiaca) vanno trattate con una terapia primaria mirata.

Se durante la somministrazione del farmaco non dovesse subentrare alcun miglioramento dei sintomi provocati dai disturbi circolatori, a seconda del tipo di malattia, il trattamento dovrà essere interrotto tempestivamente, al massimo entro 4 settimane.

Karsivan® deve essere somministrato quotidianamente e per un lungo periodo di tempo o permanentemente, ed è necessario verificare di tanto in tanto la tollerabilità. A seconda degli aspetti clinici, l'efficacia del medicamento può manifestarsi già dopo pochi giorni. In caso di interruzione del trattamento c'è da aspettarsi una lenta ricomparsa dei sintomi.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali

Non pertinente.

4.6 Effetti collaterali (frequenza e gravità)

In seguito alla somministrazione di Karsivan® possono raramente comparire reazioni cutanee allergiche (per es. orticaria) che rendono necessaria l'interruzione del trattamento.

In rari casi è stato osservato vomito, in particolare all'inizio della terapia.



In casi molto rari possono comparire dolori addominali, inappetenza, diarrea, atassia, iperattività, dispnea, tachicardia e collasso.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati manifesta effetti collaterali)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- rara (più di 1 ma meno di 10 su 10 000 animali trattati)
- molto rara (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Notificare a vetvigilance@swissmedic.ch l'insorgenza di effetti collaterali, in particolare quelli non elencati in questa rubrica.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

A causa della mancanza di dati sperimentali, non è consigliabile l'impiego su cagne gravide ed animali da riproduzione.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Dose singola: 3 mg per kg di peso corporeo

I cani ricevono le seguenti dosi **due volte al giorno**

Peso corporeo Quantità di compresse rivestite con film

| | |
|------------|-------|
| - 4 kg | 1/4 |
| 5 - 8 kg | 1/2 |
| 9 - 15 kg | 1 |
| 16 - 25 kg | 1 1/2 |
| 26 - 33 kg | 2 |
| 34 - 50 kg | 3 |

Le compresse rivestite con film possono essere divise a metà o in quarti lungo la linea di frattura con le dita e somministrate direttamente oppure nascoste in una pallina di cibo oppure sminuzzate e mescolate al cibo consumato dal cane in autonomia. Il preparato deve essere somministrato quotidianamente.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Sono stati osservati sintomi di iper-stimolazione cardiaca e cerebrale. In questi casi gli animali vanno sottoposti a terapia sintomatica.

4.11 Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: vasodilatatori periferici, propentofillina

Codice ATCvet: QC04AD90

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La propentofillina appartiene al gruppo dei derivati xantinici. Essa favorisce il flusso sanguigno a livello della microcircolazione. I disturbi della microcircolazione arteriosa sono collegati a un deterioramento delle proprietà di flusso (reologia sanguigna) degli eritrociti.

In vitro la propentofillina migliora la deformabilità dei globuli rossi danneggiati sperimentalmente, aumentando così la velocità di flusso degli eritrociti invecchiati e danneggiati dal calcio.

I disturbi circolatori sono spesso accompagnati da un aumento dell'aggregazione piastrinica. Esperimenti *in vitro* con sangue di coniglio e di cane hanno mostrato un'inibizione dell'aggregazione piastrinica indotta



sperimentalmente. A seconda della sintomatologia, l'efficacia del medicamento può manifestarsi già dopo pochi giorni. Dopo l'interruzione del trattamento c'è da aspettarsi una ricomparsa dei sintomi.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Dopo la somministrazione orale la propentofillina viene assorbita rapidamente e completamente e, come dopo la somministrazione endovena, distribuita velocemente nei tessuti. Dopo la somministrazione per via orale nel cane, il picco plasmatico è raggiunto già dopo 15 minuti. L'emivita è di circa 30 minuti e la biodisponibilità della sostanza di partenza è di circa il 30%. La propentofillina viene metabolizzata in una serie di metaboliti attivi che contribuiscono in modo significativo all'effetto farmacologico. La biotrasformazione avviene principalmente a livello epatico e la propentofillina è escreta, sotto forma dei suoi metaboliti, per l'80 - 90% per via renale. La rimanente quota è eliminata con le feci. Non vi è accumulo della sostanza.

5.3 Proprietà ambientali

Nessun dato.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Lactosum monohydricum
Maydis amylum
Crospovidonum
Talcum
Magnesii stearas
Silica colloidalis anhydrica

Rivestimento in film:

Methylhydroxypropylcellulosum
Titanii dioxidum (E171)
Talcum
Ferrum oxydatum flavo (E172)
Macrogolum 8000

6.2 Incompatibilità principali

Non note.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicamento veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15°C - 25°C).

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Confezione in blister con foglio di rivestimento in alluminio e base preformata in PVC. Un blister contiene 30 compresse.

Confezioni:

Scatola con 60 compresse rivestite con film

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicamento veterinario non utilizzato o dei materiali di rifiuto derivanti dal suo utilizzo

I medicinali veterinari non utilizzati e i rifiuti derivati da tali medicinali veterinari devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. I medicinali **non devono essere smaltiti nelle acque reflue o nei rifiuti urbani**. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.



7. TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE

MSD Animal Health Srl
Lucerna

8. NUMERO/I DI OMOLOGAZIONE

Swissmedic 48049 028 50 mg 60 compresse
Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

9. DATA DELLA PRIMA OMOLOGAZIONE/DEL RINNOVO DELL'OMOLOGAZIONE

Data della prima omologazione: 03.10.1986
Data dell'ultimo rinnovo: 23.07.2020

10. STATO DELL'INFORMAZIONE

19.08.2025

DIVIETO DI VENDITA, DISPENSAZIONE E/O UTILIZZAZIONE

Non pertinente.

