

ad us. vet.

Panazolin[®]

Pulver gegen bakterielle Infektionen beim Rind

Zusammensetzung | Composition

Pro 50 g: Sulfadimidinum 30 g, Sulfathiazolum 20 g

Indikationen

Das Wirkungsspektrum von Sulfonamiden ist breit und umfasst grampositive und gramnegative Keime sowie einige Protozoen. Panazolin ist indiziert bei Infektionskrankheiten wie: Septikämien und Pyämien, Bronchopneumonien/Pneumonien, Enteritiden, Kokzidiosen, akuten Mastitiden, Nephritiden/Pyelo-Nephritiden, Panaritien, Puerperal-Infektionen

Dosierung / Anwendung

Richtdosierung: 200 mg Sulfonamide/kg KGW und Tag verabreicht in zwei Dosen morgens und abends.

Kuh 500 kg KGW: morgens und abends: 1 Beutel

Rind 250 kg KGW: morgens und abends: ½ Beutel

Mit Wasser aufgeschwemmt eingeben oder mit dem Futter vermischt verabreichen.

Absetzfristen

Rind:

Milch: 4 Tage

Essbare Gewebe: 6 Tage

Wechselwirkungen

Mikrobielle Pansenverdauung und Darmflora werden nicht spürbar beeinflusst.

Sonstige Hinweise

Medikament ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15 - 25°C) aufbewahren. Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Packung | Présentation

1 x 50 g

Stand der Information | Mise à jour de l'information

06.2007

ad us. vet.

Panazolin®

Poudre contre les infections bactériennes chez le bovin

Indications

Le spectre d'action des sulfamidés est large; il couvre les germes gram positif et gram négatif ainsi que quelques protozoaires. Panazolin est indiqué pour le traitement de maladies infectieuses: septicémies et pyémies, broncho-pneumonies/pneumonies, entérites, coccidioses, mammites aiguës, néphrites/pyélonéphrites, panaris, infections puerpérales.

Posologie / Mode d'emploi

Dosage indicatif: 200 mg de sulfamidés par kg de PC et par jour, administrés en deux fois, matin et soir.

Vache 500 kg de PC: 1 sachet matin et soir

Génisse 250 kg de PC: ½ sachet matin et soir

Dissoudre dans de l'eau ou mélanger avec la nourriture.

Délais d'attente

Bovin:

Lait: 4 jours

Tissus comestibles: 6 jours

Interactions

La digestion microbienne dans la panse et la flore intestinale ne sont pas notablement influencées.

Remarques particulières

Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15 - 25°C). La préparation ne doit pas être utilisée au delà de la date indiquée avec «EXP.» sur l'emballage.

Zulassungsinhaber | Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeb AG, Bern



Swissmedic 48'575'001
ATCvet-Code: QJ01EQ30

50 g

graeub