

## INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Panacur® Tabletten 250 ad us. vet., per cani e gatti

Panacur® Tabletten 500 ad us. vet., per cani

#### 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Lucerna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107, AT - 1210 Vienna

#### 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Panacur® Tabletten 250 ad us. vet., per cani e gatti

Panacur® Tabletten 500 ad us. vet., per cani

#### 3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

**Principio attivo:**

Fenbendazolo 250 mg risp. 500 mg

Compressa oblunga di colore bianco o bianco-grigiastro con linea di frattura su entrambi i lati, attestata per la divisione

#### 4. INDICAZIONE(I)

Antelmintico ad ampio spettro per cani e gatti.

Infestazione di cani e gatti con i seguenti nematodi gastrointestinali e tenie:

**Nematodi**

**Anchilostomi**

**Tricocefali**

**Tenie**

Infestazione dei cuccioli di cane con *Giardia spp.*

#### 5. CONTROINDICAZIONI

Il fenbendazolo non è efficace contro dipilidi ed echinococchi.

## 6. EFFETTI COLLATERALI

Negli animali trattati possono comparire vomito o lieve diarrea. Reazioni allergiche nei cani possono verificarsi in casi molto rari (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane, gatto

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione per via orale

**Compresse 250:** 50 mg di fenbendazolo/kg di peso corporeo (PC)

½ compressa (= 125 mg di fenbendazolo) per 2,5 kg di PC

1 compressa (= 250 mg di fenbendazolo) per 5 kg di PC

**Compresse 500:** 50 mg di fenbendazolo/kg di peso corporeo (PC)

½ compressa (= 250 mg di fenbendazolo) per 5 kg di PC

1 compressa (= 500 mg di fenbendazolo) per 10 kg di PC

Ripetere il trattamento per tre giorni consecutivi.

### **Trattamento di cani e gatti adulti:**

Le compresse vengono somministrate direttamente o frantumate e mescolate al mangime.

È possibile anche sospendere le compresse in un po' d'acqua e poi mescolare la sospensione nel mangime.

### **Trattamento dei cuccioli:**

Miscelare nel mangime le compresse schiacciate o sospese in un po' d'acqua. Se le compresse vengono somministrate attraverso il mangime, il preparato deve essere prima offerto in una parte della razione abituale, per garantire l'assorbimento dell'intera dose.

Non sono necessarie misure dietetiche prima o dopo il trattamento.

In caso di nuova infezione, il trattamento va ripetuto.

Le compresse Panacur® hanno un sapore neutro e sono ben tollerate.

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per somministrazione orale.

## **10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C - 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

La resistenza dei parassiti a una specifica classe di antiparassitari può essere ridotta con la somministrazione frequente e ripetuta di antiparassitari di questa classe.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

La decisione di utilizzare il prodotto deve basarsi sulla conferma della specie e del carico del parassita o del rischio di infezione in base ai dati epidemiologici per ciascun singolo animale.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Evitare il contatto diretto della pasta con la cute. Lavarsi le mani dopo l'uso.

Gravidanza e allattamento:

Può essere utilizzato nelle cagne gravide. Siccome in casi molto rari gli effetti teratogeni nel cane e nel gatto non possono essere completamente esclusi, il trattamento nei primi due trimestri di gravidanza si deve basare sulla valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte della veterinaria/del veterinario curante.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Grazie alla buona tollerabilità del principio attivo, non sono necessarie misure di emergenza.

## **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

## **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

12.07.2022

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni:

Panacur® 250: Scatola pieghevole da 20 compresse con linea di frattura

Panacur® 500: Scatola pieghevole da 20 compresse con linea di frattura

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 49164

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.