

CHLOROPAL[®] MITE / FORTE ad us. vet.

Sospensione orale per cani, gatti e piccoli roditori Cloramfenicolo

it **Informazioni per i detentori di animali**
Informazione professionale per il personale medico vedi www.tierarzneimittel.ch

Foglietto illustrativo

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

2. Denominazione del medicinale veterinario

Chloropal mite / forte ad us. vet., sospensione orale per cani, gatti e piccoli roditori

3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 ml di sospensione contiene:

	<u>Chloropal mite</u>	<u>Chloropal forte</u>
Principio attivo: Cloramfenicolo (come cloramfenicolo palmitato)	25 mg	100 mg
Eccipiente: Benzoato di sodio (E211) 5.0 mg Sospensione orale	5.0 mg	
<u>Mite:</u> sospensione bianca		
<u>Forte:</u> sospensione viscosa, bianca		

4. Indicazioni

Antibiotico per cani, gatti e piccoli roditori
Trattamento e prevenzione delle malattie infettive in cani, gatti e piccoli roditori causati da patogeni sensibili al cloramfenicolo

5. Controindicazioni

Non utilizzare in caso di disturbi di emopoiesi, gravi danni al fegato e ai reni.
Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

6. Reazioni avverse

Chloropal mite / forte è generalmente ben tollerato. Occasionalmente, può verificarsi mancanza di appetito, vomito e diarrea. Dopo la somministrazione di dosi elevate o dopo la somministrazione per un periodo di tempo più lungo, può insorgere un disturbo di emopoiesi, soprattutto nei gatti.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. Specie di destinazione

Cane, gatto e piccolo roditore

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Dosaggio indicativo: 30 – 50 mg/kg di peso corporeo al giorno peroral
1 ml di Chloropal mite / forte contiene 25 mg o 100 mg di cloramfenicolo.

Chloropal mite

Per 1 kg di peso corporeo = 1.2 – 2 ml
Per 2 kg di peso corporeo = 2.4 – 4 ml
Per 5 kg di peso corporeo = 6 – 10 ml
Per 10 kg di peso corporeo = 12 – 20 ml

Chloropal forte

Per 4 kg di peso corporeo = 1.2 – 2 ml
Per 10 kg di peso corporeo = 3 – 5 ml
Per 20 kg di peso corporeo = 6 – 10 ml
Per 40 kg di peso corporeo = 12 – 20 ml

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Agitare prima dell'uso. La dose giornaliera raccomandata deve essere distribuita su due o tre dosi singole per evitare una diminuzione della concentrazione nel sangue. Somministrazione della dose singola prima dei pasti. Misurato con siringa di plastica chiusa.

Il principio attivo insapore insieme all'aromatizzazione genera una buona accettazione tra le specie animali bersaglio.

10. Tempi di attesa

Non utilizzare per animali destinati alla produzione di derrate alimentari.

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. Avvertenze speciali

Gravidanza ed allattamento:

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza ed l'allattamento non è stata stabilita. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Il cloramfenicolo prolunga la durata dell'effetto e/o aumenta la tossicità di alcune altre sostanze attive.

Chloropal mite / forte può essere utilizzato solo in conformità alle istruzioni veterinarie.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Un sovradosaggio di cloramfenicolo per via orale può causare disturbi gastrointestinali e/o gravi danni al midollo osseo.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

18.08.2020

15. Altre informazioni

Flacone di plastica con 10 o 50 ml di contenuto e siringa di plastica (5 ml) in scatola

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria
Swissmedic 49'413

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.