INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX

L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D’EMBALLAGE

Drontal flavour Plus ad us. vet., comprimés pour chiens

Drontal flavour Plus XL ad us. vet., comprimés pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berne

Téléphone: 031 818 56 56

Email: info.switzerland@vetoquinol.com

Fabricants responsables de la libération des lots:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE-24106 Kiel

Europhartech

34 rue Henri Matisse

F – 63370 Lempdes

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Drontal flavour Plus ad us. vet., comprimés pour chiens

Drontal flavour Plus XL ad us. vet., comprimés pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Drontal flavour Plus, comprimés pour chiens:

1 comprimé contient:

Substances actives:

Praziquantel	50 mg
Pyrantel (sf d’embonate)	50 mg

Fébantel	150 mg

Drontal flavour Plus XL , comprimés pour chiens:

1 comprimé contient:

Substances actives:

Praziquantel	175 mg
Pyrantel (sf d’embonate)	175 mg
Fébantel	525 mg

Comprimé brun clair à brun, ovale, sécable, à diviser en deux avec une ligne de sécabilité sur les deux faces.

4 INDICATION(S)

Chez les chiens, traitement des vers ronds (ascaris, ankylostomes et oxyures) et des vers plats (dont *ténia du renard, ténia tripartite du chien* et *ténia du concombre*).

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à un principe actif ou à un autre composant du médicament vétérinaire.

Chez les chiennes, n’utiliser pendant les deux premiers tiers de la gestation qu’après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire (voir section 12).

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas (moins de 1 animal sur 10'000 animaux traités), des troubles légers et transitoires de l’appareil digestif (tels que vomissements et/ou diarrhée) peuvent survenir. Dans certains cas, ces signes peuvent être accompagnés de symptômes non spécifiques tels que l’inertie, la perte d’appétit ou une activité accrue.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n’a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D’ADMINISTRATION

Drontal flavour Plus:

Sauf prescription contraire, un comprimé par 10 kg de poids corporel est administré pour une vermifugation complète. Malgré la rainure en croix, les comprimés ne peuvent être divisés qu'en demi-comprimés et ne doivent pas être divisés en ¼ de comprimé.
Drontal flavour Plus XL:
Administrer 1 comprimé par 35 kg de poids corporel.

Mode d’administration
Les comprimés sont administrés directement à l’animal. Le mieux est de les cacher dans un morceau de viande, de saucisse ou de fromage. Des mesures diététiques ne sont pas nécessaires pour les chiens adultes ni pour les chiots.

Durée du traitement
La préparation est administrée en une seule fois. En cas d’infestation de vers diagnostiquée par le vétérinaire, il faut toujours procéder à une vermifugation immédiate avec un nouveau traitement après 2 semaines.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sans objet.

10 TEMPS D’ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention « Verwendbar bis » sur la boîte.
Les demi-comprimés non utilisés ne doivent pas être conservés.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:
Les puces sont importantes pour la reproduction du ténia du concombre (*Dipylidium caninum*) très répandu.
L’infestation par les vers plats peut réapparaître à moins que des mesures de contrôle contre les puces, les souris, etc. ne soient entreprises.

Précautions particulières d’emploi chez l’animal

L’usage fréquent et répété d’un anthelminthique d’une même classe peut conduire au développement de résistance aux anthelminthiques de cette classe.
Comme le médicament vétérinaire est aromatisé, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux
Le médicament vétérinaire contient du praziquantel et est efficace contre Echinococcus spp. (infection avec le ténia du renard ou le ténia tripartite du chien). L’échinococcose constitue un danger pour l’homme. L’échinococcose étant une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), des directives particulières des autorités compétentes doivent être respectées en ce qui concerne le traitement, les contrôles ultérieurs nécessaires et la protection des personnes. Demandez plus d'informations à votre vétérinaire.

Gestation et lactation:
L’innocuité du médicament vétérinaire n’a pas été établie en cas de gestation et de lactation.
L’innocuité du médicament vétérinaire n’a pas été établie pendant le premier et le deuxième tiers de la gestation. Chez les chiennes, l’utilisation pendant les deux premiers tiers de la gestation ne doit se faire qu’après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire (voir section 5).

Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes):
Il n’existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l’objet d’un traitement symptomatique.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n’avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l’environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

12.01.2022
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Drontal flavour Plus:

- Boîtes de 12 blisters de 10 comprimés

Drontal flavour Plus XL:

- Boîtes de 3 blisters de 8 comprimés

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 49615

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.