

## INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Contralac<sup>®</sup> 5 ad us. vet., compresse per cani (cagne) e gatti (gatte)

Contralac<sup>®</sup> 20 ad us. vet., compresse per cani (cagne)

#### **1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.**

Titolare dell'omologazione: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Virbac 1<sup>ère</sup> Avenue 2065 m LID, 06516 Carros, Francia

#### **2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Contralac 5 ad us. vet., compresse per cani (cagne) e gatti (gatte)

Contralac 20 ad us. vet., compresse per cani (cagne)

#### **3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI**

1 compressa contiene:

##### **Principio attivo:**

Contralac 5: 0,5 mg di metergolina

Contralac 20: 2 mg di metergolina

Compressa rotonda di colore da bianco a crema

Compressa con dosaggio 5: non divisibile

Compressa con dosaggio 20: divisibile in 2 parti uguali

#### **4 INDICAZIONE(I)**

Per interrompere la produzione di latte nelle cagne e nelle gatte in caso di pseudogavidanza o quando i cuccioli vengono svezzati dalla madre.

## 5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in animali in gravidanza.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota al principio attivo o ad un altro eccipiente.

## 6 EFFETTI COLLATERALI

All'inizio del trattamento può verificarsi vomito. Possono verificarsi lievi diarree e cambiamenti comportamentali (irritabilità e irrequietezza).

Se si notano effetti collaterali nell'animale trattato, in particolare quelli non elencati nel foglietto illustrativo, o se si sospetta che il medicamento veterinario non abbia funzionato, informare il veterinario o il farmacista.

## 7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane (cagne), gatto (gatte)

## 8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione orale:

Cagne: somministrare 0,2 mg/kg di peso corporeo (PC) di metergolina al giorno suddivisi in due dosi per os per 4 – 8 giorni.

Gatte: somministrare 0,25 mg/kg di PC di metergolina al giorno suddivisi in due dosi per os per 4 – 8 giorni.

### **Regime di dosaggio:**

#### **Cagne piccole (Contralac 5)**

**Dose giornaliera:**

<b>Peso corporeo</b>	<b>matina</b>	<b>sera</b>
2,5 – 3 kg	1 compressa	-
3,1 – 6 kg	1 compressa	1 compressa
6,1 – 8 kg	2 compresse	1 compressa

## Cagne di taglia media e grande (Contralac 20)

### Dose giornaliera:

Peso corporeo	mattina	sera
8,1 – 10 kg	½ compressa	½ compressa
10,1 – 15 kg	1 compressa	½ compressa
15,1 – 20 kg	1 compressa	1 compressa
20,1 – 25 kg	1 ½ compresse	1 compressa
25,1 – 30 kg	1 ½ compresse	1 ½ compresse
30,1 – 35 kg	2 compresse	1 ½ compresse
35,1 – 40 kg	2 compresse	2 compresse
40,1 – 45 kg	2 ½ compresse	2 compresse
45,1 – 50 kg	2 ½ compresse	2 ½ compresse
50,1 – 55 kg	3 compresse	2 ½ compresse
55,1 – 60 kg	3 compresse	3 compresse
60,1 – 65 kg	3 ½ compresse	3 compresse
65,1 – 70 kg	3 ½ compresse	3 ½ compresse
70,1 – 75 kg	4 compresse	3 ½ compresse
75,1 – 80 kg	4 compresse	4 compresse

## Gatte (Contralac 5)

### Dose giornaliera:

Peso corporeo	mattina	sera
2,5 kg	1 compressa	-
2,6 kg – 4,5 kg	1 compressa	1 compressa
4,6 kg – 6,5 kg	2 compresse	1 compressa
6,6 kg – 8 kg	2 compresse	2 compresse

## 9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

La durata abituale del trattamento è di 4 giorni.

Se i sintomi persistono oltre la durata del trattamento, questo deve essere prolungato di 4 giorni (quindi 8 giorni in totale).

## 10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## **11        PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15 °C – 25 °C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura «EXP».

## **12        AVVERTENZE SPECIALI**

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

In caso di cambiamento del comportamento (aumento dell'aggressività), il trattamento deve essere interrotto. La regressione spesso drastica delle ghiandole mammarie può far sì che il trattamento venga interrotto troppo presto. Questo può portare a una ricaduta e il trattamento deve essere ripreso.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico e mostrare il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo devono evitare il contatto con il medicamento veterinario.

Il medicamento veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

### Gravidanza e allattamento:

Non usare durante la gravidanza.

### Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

La somministrazione contemporanea con altri medicinali veterinari deve essere discussa con un/a veterinario/a a causa delle possibili interazioni.

### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

In caso di sovradosaggio può verificarsi vomito.

### **13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Contralac non deve entrare nei corpi idrici perché può rappresentare un rischio per i pesci e gli altri organismi acquatici.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

27.06.2024

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 ALTRE INFORMAZIONI**

Contralac 5 ad us. vet: scatola pieghevole con 16 compresse (2 blister in plastica-alluminio con 8 compresse ciascuno)

Contralac 20 ad us. vet: scatola pieghevole con 16 compresse (2 blister in plastica-alluminio con 8 compresse ciascuno)

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 49'868

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nel paragrafo 1.