



GRAEUB

GENTAPEN[®] ad us. vet.

Gentapen-Injecteurs intramammaires

Gentapen-Suspension

Préparations intramammaires pour vaches

Gentamicinum, Benzylpenicillinum procainum

FR Composition

Gentapen-Injecteurs intramammaires

Gentamicinum 250 mg ut Gentamicini sulfas, Benzylpenicillinum procainum 2.5 Mio UI, Dinatrii edetas, Natrii citras, Kalii dihydrogenophosphas, Carmellosum natricum, Povidonum, Antiox.: E 223 10 mg, Conserv.: E 216 1.4 mg, E 218 10 mg, Aqua ad iniectionabilia q. s. ad suspensionem pro vase 10 g

Gentapen-Suspension

Gentamicinum 20 mg ut Gentamicini sulfas, Benzylpenicillinum procainum 200'000 UI, Dinatrii edetas, Natrii citras, Kalii dihydrogenophosphas, Carmellosum natricum, Povidonum, Antiox.: E 223 1 mg, Conserv.: E 216 0.14 mg, E 218 1 mg, Aqua ad iniectionabilia q. s. ad suspensionem pro 1 ml

Propriétés / Effets

La suspension et les injecteurs intramammaires Gentapen contiennent de la pénicilline et de la gentamicine. Grâce à sa bonne efficacité et son excellente tolérance, la pénicilline est un antibiotique de premier choix pour traiter les infections à streptocoques, y compris *S. agalactiae*, ainsi que les infections à staphylocoques sensibles à la pénicilline. La gentamicine est particulièrement indiquée pour le traitement des infections dues à *E. coli* et aux staphylocoques résistants à la pénicilline. Ces germes ne présentent en effet que rarement une résistance à la gentamicine.

La suspension et les injecteurs intramammaires Gentapen couvrent ainsi un très large spectre d'agents pathogènes responsables de mammites. Grâce à leur formulation, ces préparations sont très bien tolérées.

Indications

Traitement et prévention des mammites aiguës et chroniques dues à des agents sensibles à la pénicilline et à la gentamicine tels que streptocoques, *S. agalactiae*, microcoques, staphylocoques, *E. coli* et *Corynebacterium pyogenes*

Posologie / Mode d'emploi

Traitement initial: administrer 25 ml de Gentapen-Suspension dans chaque quartier malade. 12 et 24 heures après le traitement initial, administrer le contenu d'un injecteur dans chaque quartier malade. Auparavant, traire complètement afin d'éliminer toutes les sécrétions pathologiques (p. ex. avec Pitosol-10 ou Oxytocin-20 Graeub). Désinfecter le bout du trayon. Introduire soigneusement l'embout de l'injecteur dans le canal du trayon. Après administration, masser légèrement la mamelle.

Délais d'attente

Bovin:

5 jours

Lait:

5 jours

Tissus comestibles:

Remarques particulières

Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8°C. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser avant la date indiquée avec «EXP.» sur l'emballage. Gentapen-Suspension: Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 14 jours et conserver à l'abri de la lumière. Agiter avant utilisation.

Présentation

Gentapen-Suspension: Flacon de 200 ml en matière synthétique avec embout Luer et 8 sondes trayeuses

Swissmedic 49'909 (A)

Gentapen-Injecteurs intramammaires:

Boîte avec 4 et 100 injecteurs de 10 g

Swissmedic 49'910 (A)

ATCvet-Code: QJ51RC23

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Mise à jour de l'information: novembre 2003