

# GENTAPEN® ad us. vet.

## Siringa intramammaria per vacche Gentamicinum, Benzylpenicillinum procainum

### Foglio illustrativo

#### Informazione per proprietarie e proprietari di animali

Informazione professionale destinata agli operatori può essere consultata sul sito [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

#### 1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

Titolare dell'autorizzazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:  
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

#### 2. Denominazione del medicamento veterinario

Gentapen ad us. vet., siringa intramammaria per vacche

#### 3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 iniettore con 10 g di sospensione contiene:

<b>Principi attivi:</b>	Iniettori
Gentamicina (sotto forma di Gentamicinsolfato)	250 mg
Benzilpenicillina procaina	2.5 Mio U.I.
<b>Eccipienti:</b>	
Metile paraidrossibenzoato (E 218)	10 mg
Propile paraidrossibenzoato	1.4 mg
Metabisolfito di sodio (E 223)	10 mg

Sospensione da bianca a quasi bianca in siringhe per uso intramammario

#### 4. Indicazioni

Preparazione contro la mastite della vacca  
Trattamento e prevenzione della mastite acuta e cronica causata germi sensibili alla penicillina o alla gentamicina.

#### 5. Controindicazioni

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

#### 6. Effetti collaterali

Possono verificarsi reazioni allergiche (insufficienza circolatoria grave e potenzialmente letale, reazioni allergiche cutanee).  
Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglio illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario.

#### 7. Specie di destinazione

Vacca

#### 8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Trattamento iniziale: infondere 25 ml di Gentapen sospensione in ciascun quarto affetto.  
Trattamento successivo: infondere due volte a intervalli di 12 o 24 ore il contenuto di una siringa in ogni quarto affetto.

#### 9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Agitare la siringa prima dell'uso.

Dapprima mungere a fondo per rimuovere il più possibile le secrezioni patologiche della mammella (se possibile dopo l'infusione di un medicinale veterinario contenente ossitocina). Disinfettare la punta del capezzolo. Introdurre l'attacco sterile della siringa nel dotto papillare. Dopo l'infusione, massaggiare delicatamente la mammella.

#### 10. Tempi di attesa

Latte, tessuti commestibili: 5 giorni

#### 11. Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare in frigorifero (2 – 8 °C).

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

#### 12. Avvertenze speciali

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamentoveterinario agli animali:

Evitare il contatto diretto con la pelle o le mucose dell'utilizzatore per il rischio di sensibilizzazione. Le persone con nota ipersensibilità alla penicillina devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

Gravidanza ed allattamento:

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

#### 13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti, se necessario

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere alla/al propria/o veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

#### 14. Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

15.08.2023

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

#### 15. Altre informazioni

Confezione con 4 o 100 siringhe da 10 g

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 49'910

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.