

Vetisept® ad us. vet.

Vetisept solution 10 %

Vetisept comprimés intra-utérins

Vetisept spray

Vetisept pommade

Désinfectant pour animaux

Composition

Solution 10 % / spray: Iodum 10 mg resp. 5 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. ad solut. pro 1 ml

Pommade: Iodum 10 mg (ut Polyvidonum-Iodum), Macrogolum 400,
Excip. ad unguent. pro 1 g

Comprimés intra-utérins: Iodum 100 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. pro compr.

Propriétés / Effets

Le polyvinylpyrrolidone iodé est un complexe organique à base d'iode et d'un polymère hydro-soluble (PVP). Le PVP agit comme solvant, stabilisateur et colloïde protecteur. Ainsi l'iode est libéré à l'endroit où il doit agir. Le polyvinylpyrrolidone iodé possède l'efficacité et le large spectre d'action de l'iode, mais il est moins toxique, plus stable et hydrosoluble. Il a une action bactéricide, fongicide, protozoocide, sporicide et virucide. L'action microbicide est immédiate et dure longtemps. Tant que la teinture brun-dorée est visible, l'efficacité de Vetisept est garantie. Vetisept n'irrite ni la peau ni les muqueuses. L'eau froide ne diminue pas l'effet désinfectant; celui-ci persiste également en présence de savons, détergents et graisses. Les taches éventuelles sur les mains et les textiles peuvent facilement être éliminées avec de l'eau et du savon.

Indications

Vetisept solution 10 % / Vetisept spray

En général: Désinfection des mains, de la peau et du champ opératoire, traitement de plaies, abcès, infections cutanées, désinfection du cordon ombilical du nouveau-né

Cheval: Traitement des sabots (p. ex. clou de rue)

Bovin: Traitement des onglons (p. ex. ulcère selon Rusterholz, limace, panaris), pseudo-variole du pis, eczéma de l'aîne, mycoses («darters»), endométrite, pyomètre, cervicite, vaginite, prolapsus utérin

Mouton, chèvre: Piétin, ecthyma contagieux

Chien, chat: Morsure, otite externe, inflammation du prépuce, stomatite, acné, furonculose, mycoses (dermatomycoses)

Vetisept pommade

Cheval: Couronnement et blessures dues à des pressions de selle

Bovin: Blessures diverses, blessures du pis

Chien, chat: Morsure, acné, furonculose, mycoses (dermatomycoses)

Vetisept comprimés intra-utérins

Bovin: Prévention et traitement des infections puerpérales, rétention placentaire, endométrite

Posologie / Mode d'emploi

Vetisept solution 10 %

Chirurgie: } application locale, non diluée, ev. à répéter

Dermatologie: }

Gynécologie: bovin:

- Traitement lors de stérilité: 10 - 30 ml } application intra-utérine, non diluée

- Troubles puerpéraux: 30 - 50 ml } ou diluée avec de l'eau

Vetisept spray

Vaporiser uniformément la zone à traiter plusieurs fois par jour, selon les indications du vétérinaire.

Vetisept pommade

Traiter jusqu'à 3 fois par jour; si nécessaire, couvrir d'un pansement.

Vetisept comprimés intra-utérins

Introduire 2 à 3 comprimés dans l'utérus.

Délai d'attente: aucun

Interactions

Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants.

Remarques particulières

Conserver à température ambiante (15 - 25°C). Utiliser avant la date indiquée avec «EXP.» sur l'emballage. Tenir hors de portée des enfants.

Présentations

Vetisept solution 10 %: 120 ml, 220 ml, 1 litre et 5 litres

Vetisept spray: 170 ml

Vetisept pommade: 20 g, 100 g et 450 g

Swissmedic 50'513 (D)

Swissmedic 50'516 (D)

Swissmedic 50'515 (D)

ATCvet-Code: QD08AG02

Swissmedic 50'514 (B)

ATCvet-Code: QG51AD01

Vetisept comprimés

intra-utérins: 10 comprimés intra-utérins

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Mise à jour de l'information: mai 2006

graeub