INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Bayvarol ad us. vet., strisce per alveare per api da miele

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Elanco Tiergesundheit AG

Mattenstrasse 24A

4058 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Germania

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Bayvarol ad us. vet., strisce per alveare per api da miele

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Composizione

1 striscia (strisce di polietilene) contiene:

Principio attivo:

3,6 mg di flumetrina (piretroide)

Strisce da appendere negli spazi tra i favi.

4 INDICAZIONE(I)

Per il controllo degli acari della varroa nelle api da miele.

5 CONTROINDICAZIONI

Da novembre/dicembre fino all'estate successiva le strisce di Bayvarol non devono essere appese né lasciate all'interno delle colonie. In caso di temperature inferiori a +5 C l'efficacia si riduce a causa della minore mobilità delle api.

6 EFFETTI COLLATERALI

Con questo tipo di applicazione non sono stati finora osservati effetti collaterali a carico della covata e delle api.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Ape da miele

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Le colonie normalmente sviluppate ricevono quattro strisce. Le colonie deboli, le propaggini e le colonie giovani, che occupano meno della metà dei favi, ricevono metà dose, ovvero 2 strisce. Trattare sempre tutte le colonie di un apiario. L'applicazione di Bayvarol avviene dopo la rimozione del melario nel periodo dalla fine di luglio a settembre. Le strisce di Bayvarol devono essere lasciate nell'alveare da 4 a un massimo di 6 settimane. Successivamente, le strisce devono essere rimosse dalle colonie di api, per ridurre il più possibile la contaminazione del materiale del favo e la tendenza degli acari di varroa a diventare resistenti al principio attivo del Bayvarol (flumetrina). L'utilizzo ripetuto delle strisce di Bayvarol non è indicato.

Non è consentito l'uso di Bayvarol per fini diagnostici. La diagnosi della varroatosi deve avvenire mediante mezzi non chimici, effettuando il controllo con vassoi dotati di griglia di protezione.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le strisce di Bayvarol vengono appese nell'area del nido di covata negli spazi tra i favi in modo che le api possano accedervi da entrambi i lati. A tale scopo le linguette di sospensione vengono ripiegate sui punti di piegatura previsti e contrassegnati, ambedue verso lo stesso lato, e sospese sul supporto superiore del telaio di covata (schema 3). La sospensione delle strisce contro il bordo del favo di covata (schema 1) evita che lo sviluppo della covata sia disturbato dalla riduzione delle celle nell'area della striscia.

Nell'arnia svizzera: Sospendere le strisce alternandole, una volta a sinistra e una volta a destra, in quattro spazi tra i favi nell'area del nido di covata secondo lo schema 1. La sospensione delle quattro strisce di Bayvarol tra

i favi può avvenire in occasione di un controllo della colonia.

Nell'arnia americana: Sospensione delle quattro strisce di Bayvarol in quattro spazi tra i favi nell'area del nido di covata e del foro dell'alveare secondo lo schema 2. Ciò garantisce un accesso ottimale delle strisce da parte delle api.

Posizionamento delle strisce di Bayvarol

Schema 1:	Schema 2:	Schema 3:
Arnia svizzera (favo a caldo)	Arnia americana, ad es. Dadant (favo a freddo)	Linguette di sospensione sui punti di piegatura previsti e contrassegnati

ripiegare ambedue verso lo stesso lato, fissare sul supporto superiore del telaio di covata e sospendere negli spazi tra i favi.

Foro dell'alveare

Foro dell'alveare

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Per il miele delle colonie correttamente trattate non è necessario alcun tempo di attesa.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale a una temperatura inferiore ai 30 gradi.

Proteggere dalla luce.

Tenere lontano dagli alimenti.

Tenere il medicamento fuori dalla portata dei bambini.

Periodo di validità del medicamento veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi

Non impiegare Bayvarol dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Gli acari di varroa possono diventare resistenti ai piretroidi (a cui appartiene anche il principio attivo contenuto nelle strisce di Bayvarol). In tal caso, il successo del trattamento viene messo in discussione. Si raccomanda di sottoporre a un ulteriore trattamento a campione in autunno (novembre), mediante un'applicazione singola di acido ossalico, le colonie di api trattate in estate con le strisce di Bayvarol.

In questo caso, se nelle singole colonie gli acari caduti superano i 50, è indicato un singolo trattamento con acido ossalico per tutte le colonie dell'azienda apicola.

L'uso improprio delle strisce di Bayvarol (ad es. per un periodo di tempo prolungato) può determinare la presenza di residui elevati del principio attivo flumetrina nella cera d'api, nella propoli e nel polline.

Anche il miele può essere contaminato da residui di cera contenenti Bayvarol.

Durante il periodo del trattamento e nei 2 mesi successivi è necessario astenersi dalla raccolta del polline per evitare possibili contaminazioni.

L'utilizzo ripetuto delle strisce di Bayvarol non è indicato.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Durante l'applicazione delle strisce di Bayvarol è necessario indossare guanti di gomma ed evitare il contatto con gli occhi e la cute. Non bere né mangiare durante l'operazione. Dopo l'operazione lavarsi le mani con acqua e sapone.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Nessuna nota finora.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi.

Incompatibilità:

Non pertinente

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Bayvarol è tossico per i pesci e non deve essere disperso nei corsi d'acqua, poiché può risultare pericoloso per i pesci e per altri organismi acquatici.

Dopo il trattamento rimuovere le strisce di Bayvarol dalla colonia di api, chiuderle in sacchetti di plastica e rispedirle al relativo fornitore per lo smaltimento.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

02.08.2022

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole con 5 buste di alluminio ognuna contenente 4 strisce con un peso di 6,61 g ciascuna.

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica
Swissmedic 51604

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.