

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

exspot® ad us. vet., solution pour l'application cutanée pour les chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: MSD Animal Health SARL, Werftstrasse 4, 6005 Lucerne

Fabricant responsable de la libération des lots: Intervet Productions s.r.l. Via Nettunense Km.20,300; IT-04011 Aprilia (LT)

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

exspot® ad us. vet., solution pour l'application cutanée pour les chiens

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 ml contient:

Substance active:

Perméthrine 715 mg

Solution pour l'application cutanée

Solution claire, jaune à brun clair

4. INDICATION(S)

Pour lutter (prévention/répulsion et le traitement) contre les puces et pour le traitement des tiques (tique brune du chien, tique du mouton).

Pour la lutte (effet anti-gorgement et élimination) contre les phlébotomes.

Une seule application élimine puces et tiques et protège d'une ré-infestation pendant les deux à quatre semaines qui suivent le traitement.

L'effet anti-gorgement et l'effet insecticide sur les phlébotomes persiste pour 2 semaines au moins.

Remarque: la fixation des tiques isolées ne peut être exclue.

5. CONTRE-INDICATIONS



Ne pas utiliser pour les chats!

La perméthrine est extrêmement toxique pour les chats. exspot[®] ne doit en aucun cas, même en quantités infimes, être utilisé pour les chats car leur organisme ne leur permet pas de métaboliser la quantité de perméthrine contenue dans exspot[®]. Pour éviter tout contact malencontreux avec exspot[®], les chats seront tenus éloignés des chiens traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. On s'assurera que les chats ne lèchent pas les chiens traités à l'endroit de l'application.

Des intoxications sévères peuvent en être la conséquence, caractérisées par des convulsions et des troubles locomoteurs pouvant se solder par la mort du chat.

En cas d'application erronée, la première mesure sera de laver et de baigner le chat avec un shampoing doux ou avec du liquide vaisselle. Le patient sera ensuite emmené sans délai chez un vétérinaire.

Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 2 semaines.

Ne pas administrer aux animaux malades ou convalescents.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'autre composant.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), une réaction d'hypersensibilité locale avec rougeur, démangeaisons, alopecie et formation de cloques peut apparaître au site d'application. Perte d'appétit, vomissements, fatigue, agitation, tremblements, convulsions, signes de paralysie et/ou ataxie figurent également parmi les symptômes fréquents (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités). Ces effets indésirables sont généralement passagers et disparaissent en quelques heures si le chien est lavé avec de l'eau et du shampoing. Dans les cas plus graves, consulter un vétérinaire.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.





7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Pour une application directe sur la peau

- Chiens pesant entre 2.5 et 6.5 kg: 0.5 ml (1/2 pipette)
- Chiens pesant entre 6.5 et 15 kg: 1 ml (1 pipette)
- Chiens pesant entre 15 kg et 29 kg: 2 ml (2 pipettes)
- Chiens de 30 kg et plus: 3 ml (3 pipettes)

				
Poids du chien (kg)	2.5 - 6.5 kg	6.5 - 15 kg	15 - 29 kg	> 30 kg
Volume de produit	0.5 ml	1 ml	2 ml	3 ml
Site d'application	0.5 ml (1/2 pipette) entre les omoplates	1 ml (1 pipette) entre les omoplates	1 ml (1 pipette) entre les omoplates et 1 ml (1 pipette) à la base de la queue	1 ml (1 pipette) entre les omoplates, 1 ml (1 pipette) à la base de la queue et 1 ml (1 pipette) au milieu de la ligne du dos
Perméthrine (mg/kg PC)	Entre 143 mg/kg PC et 55 mg/kg PC chez les chiens de 2.5 à 6.5 kg	Entre 110 mg/kg PC et 48 mg/kg PC chez les chiens de 6.5 à 15 kg	Entre 95 mg/kg PC et 49 mg/kg PC chez les chiens de 15 à 29 kg	Débutant avec 72 mg/kg PC chez les chiens de 30 kg; réduction de la dose à mesure que le poids augmente

Ecarter le pelage et appliquer le volume indiqué directement sur la peau entre les omoplates, à la base de la queue ou au milieu de la ligne du dos.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Mode d'application

Gouttes à appliquer uniquement sur la peau.
Ouvrir l'emballage et sortir la pipette.



1ère étape: Pour faciliter l'opération, il est préférable que le chien se tienne debout. D'une main, maintenir la pipette en position verticale, en évitant de la diriger vers le propre visage. De l'autre, casser la pointe en la pliant d'un côté et de l'autre.



2ème étape: Ecarter le pelage sur le dos du chien, au niveau des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe la pipette sur la peau. Presser fortement la pipette pour appliquer la totalité de son contenu sur la peau.

Pour les chiens de grande taille, veuillez utiliser 2-3 pipettes, selon le tableau de dosage.

Chez les chiens exposés plusieurs fois à des pluies violentes ou prenant des bains réguliers, le traitement pourra être répété.

Il est possible de répéter l'application du produit au plus tôt après 7 jours.

Les chiens traités avec exspot® ne seront pas lavés avec des shampoings détergents.

Pour éviter une ré-infestation par les puces ou les tiques, la couche du chien et son environnement direct seront également traités avec les produits adéquats.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. À conserver dans un endroit sec.

Protéger de la lumière. Ne pas congeler.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Ne pas administrer aux chiens qui présentent des lésions cutanées, notamment dans la région du dos.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Ce médicament vétérinaire est destiné à un usage externe uniquement.

Veiller à ce que l'animal ne lèche pas le site d'application.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains après l'administration.

En cas de contact accidentel d'exspot® avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Laver immédiatement en cas d'éclaboussures.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'administration d'exspot®.

Eviter le contact avec l'endroit traité pendant les 3 à 6 heures qui suivent le traitement. Il est donc recommandé de traiter les animaux le soir. Les animaux récemment traités ne dormiront pas dans le lit de leur maître, ni, à plus forte raison, avec des enfants.

Les personnes qui administrent souvent ce produit, par exemple dans les chenils, porteront des gants de protection en néoprène ou en nitrile d'une épaisseur de 3 mm au moins.

Gestation et lactation:

Les études réalisées chez des animaux de laboratoire démontrent que la perméthrine comme l'excipient utilisé ne semblent pas présenter de risque tératogène. Les recherches menées avec la perméthrine sur des chiennes gravides n'ont pas mis en évidence d'effets négatifs, ni sur les chiots, ni sur la mère. La formulation utilisée ici n'a pas fait l'objet de recherches quant à son utilisation pendant la gestation ou la période de lactation. La sécurité d'utilisation du produit pendant la gestation ou la lactation n'a pas été étudiée chez le chien.

Si nécessaire, les chiennes gravides seront traitées un certain temps avant la mise-bas, afin de minimiser l'exposition des chiots nouveau-nés au produit.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Pour plus d'informations sur le surdosage chez le chat, voir rubrique 5. Contre-indications.

Propriétés environnementales:

Toxique pour les poissons, les organismes aquatiques et les abeilles! Ne pas utiliser à proximité d'un aquarium ou d'un bassin à poissons.

Les animaux traités ne doivent pas entrer en contact avec l'eau de surface pendant au moins 24 heures après l'application.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

Éliminer la quantité restante du produit dans les pipettes entamées.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

05.06.2023

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Présentations: Boîte avec 6 pipettes de 1 ml
Boîte à 6 boîtes avec 6 pipettes de 1 ml

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 51793

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.