

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito
www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

exspot® ad us. vet., soluzione per l'applicazione sulla pelle per cani

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione: MSD Animal Health Srl, Werftstrasse 4, 6005 Lucerna
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Intervet Productions s.r.l. Via Nettunense
Km.20,300; IT-04011 Aprilia (LT)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

exspot® ad us. vet., soluzione per l'applicazione sulla pelle per cani

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 ml contiene:

Principio attivo:

Permetrina 715 mg

Soluzione per l'applicazione sulla pelle
Soluzione limpida, da gialla a marrone chiaro

4. INDICAZIONE(I)

Per la lotta (repellenza/prevenzione e cura) contro le pulci e per il trattamento contro le zecche (*Rhipicephalus sanguineus*; *Ixodes ricinus*).

Per la lotta ('anti-feeding-effect' ed eliminazione) contro i flebotomi.

Un'unica applicazione elimina sia le pulci che le zecche e protegge da una reinfestazione per un lasso di tempo dalle due alle quattro settimane dalla somministrazione.

L'anti-feeding-effect' e l'effetto insetticida contro i flebotomi si protrae per un periodo di almeno 2 settimane.

Attenzione: l'adesione di singole zecche non può essere esclusa.

5. CONTROINDICAZIONI



Non utilizzare sui gatti!

La permetrina è estremamente tossica per i gatti. exspot® non può in nessun caso, anche in quantità minime, essere utilizzato nei gatti. I gatti non sono in grado di metabolizzare la quantità di permetrina contenuta nell'exspot®. Per evitare un inavvertito contatto con exspot®, bisognerà allontanare i gatti dai cani appena trattati, finché la zona d'applicazione non sarà asciutta. E' necessario assicurarsi che i gatti non arrivino a poter leccare la zona d'applicazione del prodotto sul cane. Possono manifestarsi sintomi di avvelenamento particolarmente pericolosi, che possono sfociare in forti crampi muscolari e disturbi della motilità, portando anche alla morte del gatto. Come primo intervento, bisogna togliere il prodotto lavando il gatto con uno shampoo delicato o detersivo per piatti. Il paziente dovrebbe poi essere portato il prima possibile da una veterinaria/un veterinario.

Non utilizzare nei cuccioli con meno di 2 settimane di vita.

Non utilizzare in cani malati o convalescenti.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o all'eccipiente.

6. EFFETTI COLLATERALI

In rari (più di 1 ma meno di 10 su 10 000 animali trattati) casi si possono manifestare sintomi d'ipersensibilità locale nella zona d'applicazione, quali arrossamenti, prurito, perdita di pelo e formazione di vesciche. Sintomi comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati) potrebbero anche essere la perdita dell'appetito, vomito, spossatezza, agitazione, tremore, convulsioni, paralisi e/o atassie. Questi effetti collaterali sono di regola passeggeri e scompaiono nell'arco di poche ore dopo che il cane è stato lavato con acqua e sapone. In casi gravi bisogna consultare la veterinaria/il veterinario.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.





7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per un'applicazione diretta sulla cute:

- | | |
|---|----------------------|
| • Cani dai 2.5 kg ai 6.5 kg di peso corporeo: | 0.5 ml (1/2 pipetta) |
| • Cani dai 6.5 kg ai 15 kg di peso corporeo: | 1 ml (1 pipetta) |
| • Cani dai 15 kg ai 29 kg di peso corporeo: | 2 ml (2 pipette) |
| • Cani dai 30 kg di peso corporeo e oltre: | 3 ml (3 pipette) |

				
Peso del cane (kg)	2.5 - 6.5 kg	6.5 - 15 kg	15 - 29 kg	> 30 kg
Quantità del prodotto	0.5 ml	1 ml	2 ml	3 ml
Zona di applicazione	0.5 ml (1/2 pipetta) fra le scapole	1 ml (1 pipetta) fra le scapole	1 ml (1 pipetta) fra le scapole e 1 ml (1 pipetta) alla base della coda	1 ml (1 pipetta) fra le scapole, 1 ml (1 pipetta) alla base della coda e 1 ml (1 pipetta) sulla schiena
Permetrina (mg/kg peso corporeo)	143 mg/kg PC fino a 55 mg/kg PC nei cani dai 2.5 ai 6.5 kg	110 mg/kg PC fino a 48 mg/kg PC nei cani dai 6.5 ai 15 kg	95 mg/kg PC fino a 49 mg/kg PC nei cani dai 15 ai 29 kg	Da 72 mg/kg PC nei cani dai 30 kg, diminuendo la dose con l'aumentare del peso corporeo

Separare accuratamente il pelo e applicare la dose direttamente sulla pelle nella zona fra le scapole o alla base della coda o sulla schiena.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Tipo d'uso

Unicamente da cospargere sulla pelle.
Aprire l'imballaggio e levarne la pipetta.



1° tappa: Per facilitare l'operazione, è preferibile che il cane stia ritto sulle zampe. Tenere la pipetta con una mano, in posizione verticale, evitando di dirigerla verso il proprio viso. Con l'altra mano, spezzarne la punta, piegandola alternativamente da ambo i lati.



2° tappa: scostare il pelo sul dorso, nella zona fra le scapole, in modo da vedere la pelle. Posare la punta della pipetta sulla pelle. Premere forte la pipetta, affinché l'intero contenuto si sparga sulla pelle. Per cani di grandi dimensioni occorrono 2-3 pipette, secondo la tabella di dosaggio.

I cani che sono stati esposti a frequenti temporali o stati particolarmente a contatto con l'acqua, dovrebbero ripetere la terapia un'altra volta.

La nuova applicazione del prodotto può essere effettuata al più presto dopo 7 giorni.

I cani trattati con exspot® non dovrebbero essere lavati con shampì sgrassanti.

Per evitare una reinfestazione di pulci e zecche, anche i giacigli e l'ambiente circostante nei quali vivono i cani, dovrebbero essere trattati con un prodotto specifico.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare in luogo asciutto.

Proteggere dalla luce. Non congelare.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

I cani con lesioni cutanee, soprattutto nella zona della schiena, sono da escludere dalla terapia.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Questo medicamento veterinario è prescritto esclusivamente ad uso esterno.

Bisogna evitare che l'animale si lecchi la zona d'applicazione.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavare le mani dopo l'utilizzo del prodotto.

Nel caso che exspot® venga inavvertitamente a contatto con gli occhi, risciacquarli abbondantemente con acqua.

Asciugare immediatamente il liquido disperso.

Durante l'utilizzo di exspot® non mangiare, bere o fumare.

Per la durata di 3-6 ore dopo l'utilizzo, bisogna evitare il contatto con la zona della pelle trattata.

Si consiglia quindi l'applicazione del prodotto la sera. I cani appena trattati non devono poi dormire nel letto con la padrona/il padrone, soprattutto con i bambini.

Persone che utilizzano spesso il prodotto, ad esempio nei canili, dovrebbero indossare guanti di neoprene o nitrile con uno spessore di almeno 3 mm.

Gravidanza e allattamento:

Gli studi sugli animali da laboratorio hanno mostrato che né la permetrina né la sostanza ausiliaria favoriscono malformazioni. Esami riguardo all'utilizzo della permetrina in cagne durante la gravidanza non hanno dimostrato rischi né per i cuccioli né per le cagne. Non sono però ancora stati eseguiti esami relativi all'utilizzo di questo medicamento veterinario durante la gravidanza e l'allattamento. La sicurezza nell'utilizzo del prodotto in cagne durante la gravidanza e l'allattamento non è quindi stata comprovata.

Se necessario, le cagne gravide dovrebbero eventualmente essere trattate sufficientemente prima del parto, in modo da ridurre al minimo l'esposizione al prodotto dei cuccioli appena nati.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per informazioni sul sovradosaggio nei gatti, vedere paragrafo 5. Controindicazioni.

Proprietà ambientali:

Pericoloso per pesci, esseri viventi acquatici ed api! exspot® non deve quindi essere utilizzato in prossimità di acquari, vasche con pesci, ecc.

Gli animali trattati non devono entrare in contatto con l'acqua di superficie per almeno 24 ore dopo l'applicazione.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

Il prodotto non utilizzato nelle pipette aperte deve essere eliminato.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

05.06.2023

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

Scatola con 6 pipette da 1 ml

Scatola da 6 scatole con 6 pipette da 1 ml

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 51793

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.