

Dentisept[®] ad us. vet.

Dental-Adhäsiv-Paste für Hunde und Katzen

Zusammensetzung

1 g Paste enthält:

Chlorhexidinum 2 mg

Aromatica: Vanillinum

Excip. ad past.

Eigenschaften / Wirkungen

Chlorhexidin besitzt desinfizierende Eigenschaften und vernichtet zuverlässig Bakterien und Pilze. Es hat sich bei der vorbeugenden Behandlung von Plaque- und Zahnsteinbildung sowie der Bekämpfung von Zahnfleischentzündungen und Lefzendermatitis bestens bewährt. In der Mundhöhle besitzt es einen speziellen Wirkungsmechanismus. Im Gegensatz zu allen anderen bekannten Mitteln wird Chlorhexidin in der Mundhöhle an Eiweisse und Zahnschmelz gebunden und im Laufe von 24 Stunden allmählich wieder abgegeben. Dadurch entsteht ein Depot-Effekt. Zudem liegt Chlorhexidin in Dentisept in einer besonderen Formulierung vor, welche dem Präparat eine aussergewöhnliche Haftwirkung auf Mundhöhlenschleimhaut und Zähnen verleiht. Erstens kann es dadurch besonders gut aufgebracht werden, und zweitens wirkt es wesentlich länger. Zusätzlich überdecken Aromastoffe den unangenehmen Geschmack von Chlorhexidin und verleihen dem Präparat eine gute Akzeptanz.

Wenn Dentisept regelmässig angewendet wird, verzögert bzw. verhindert es die Bildung von Zahnstein.

Indikationen

Zahnfleischentzündung, Zahnplaque, Zahnstein und Lefzendermatitis bei Hund und Katze

Dosierung / Anwendung

Vor allem für Behandlungen in der Mundhöhle empfiehlt es sich, die beiliegende Pipette auf die Tube aufzuschrauben. Damit kann auch das Zahnfleisch im Bereich der hinteren Backenzähne leicht erreicht werden. Das aufgebrachte Dentisept wird mit einem Finger sorgfältig verteilt und leicht einmassiert.

Bei Verwendung von Dentisept genügt je nach Lage des Falles eine tägliche bis wöchentliche Behandlung. Sie soll nicht vor, sondern nach dem Füttern erfolgen, damit das Präparat möglichst lange haften bleibt und nicht vorzeitig abgerieben wird.

Anwendungseinschränkungen

Keine bekannt

Unerwünschte Wirkungen

Dentisept ist ein sehr gut verträgliches Präparat. Nur ganz vereinzelt reagieren Katzen mit Speicheln. Bei Anwendung über längere Zeit kann eine Braunfärbung der Zahnhäule auftreten, die aber mit dem Ultraschallgerät leicht entfernt werden kann.

Wechselwirkungen

Keine bekannt

Sonstige Hinweise

Um den Finger zu reinigen, empfiehlt es sich, ihn zuerst mit einem (Papier-) Tuch trocken abzureiben und dann die Hände mit Seife zu waschen. Unter 25°C lagern. Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Medikament ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Packungen

Tube zu 20 g mit aufschraubbarer Pipette

Zulassungsinhaberin

Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic 52'272 (D)
ATCvet-Code: QA01AB03