

Dentisept® ad us. vet.

Pâte dentaire adhésive pour chiens et chats

Composition

1 g de pâte contient:

Chlorhexidinum 2 mg

Aromatica: Vanillinum

Excip. ad past.

Propriétés / Effets

La chlorhexidine a des propriétés désinfectantes et possède un excellent effet antibactérien et antimycotique. Elle a largement fait ses preuves dans la prévention de la formation de plaque dentaire et de tartre, ainsi que lors de la lutte contre les gingivites et la dermatite des babines. Dans la cavité buccale, elle agit selon un mode d'action spécifique. Contrairement à tous les autres produits connus, la chlorhexidine se lie à des protéines et à l'émail dentaire dans la cavité buccale, puis est progressivement libérée en l'espace de 24 heures. Ainsi, il se produit un effet dépôt. Par ailleurs, la formule spéciale de la chlorhexidine contenue dans Dentisept confère à la préparation une adhérence remarquable à la muqueuse buccale ainsi qu'aux dents. Par conséquent, Dentisept est particulièrement facile à appliquer et agit nettement plus longtemps. Enfin, des substances aromatisantes couvrent le goût désagréable de la chlorhexidine, de telle sorte que la préparation est bien acceptée.

En cas d'utilisation régulière de Dentisept, la formation de tartre est retardée ou empêchée.

Indications

Gingivite, plaque dentaire, tartre et dermatite des babines chez le chien et le chat

Posologie / Mode d'emploi

En particulier lors de traitements de la cavité buccale, il est conseillé de visser la pipette incluse sur le tube, de telle sorte que les gencives dans la zone des molaires puissent être atteintes facilement. Une fois la pâte appliquée, répartir soigneusement avec le doigt et frictionner légèrement.

Selon les cas, la fréquence du traitement peut s'étendre d'une fois par jour à une fois par semaine. Appliquer après le repas. Ainsi, la préparation adhère aussi longtemps que possible et n'est pas éliminée par frottement.

Limitations d'emploi

Aucune connue

Effets indésirables

Dentisept est généralement très bien toléré. Dans de rares cas, une salivation excessive peut survenir chez le chat. En cas d'utilisation prolongée du traitement, une coloration brunâtre du collet des dents peut survenir, qui peut cependant être facilement éliminée au moyen d'un appareil à ultrason.

Interactions

Aucune connue

Remarques particulières

Afin d'éliminer d'éventuels résidus sur les doigts, il est conseillé de les frotter avec une serviette (en papier) sèche puis de se laver les mains au savon. Conserver en dessous de 25°C. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date de péremption, figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage. Tenir hors de portée des enfants.

Présentation

Tube de 20 g avec pipette à visser

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Swissmedic 52'272(D)
ATCvet-Code: QA01AB03

Mise à jour de l'information: juillet 2003