

## **Ilcocillin™ P300 ad us. vet.**

Antibiotique pour bovins. ovins. porcins, chiens et chats

### **Composition**

Principe actif: Benzylpenicillinum procainum 300 000 U.I. (correspondant à 300 mg), Lecithinum, Polyvidonum K 12, Natrii edetas, Natrii citras, Kalii dihydrogenophosphas, Polysorbatum 80, Simethiconum, Conserv.z E 215, E 217, E 219 1,5 mg, Aqua ad iniectabilia q.s. ad suspensionem pro 1 ml.

Suspenswn injectable aqueuse

### **Propriétés/Effets**

Ilcocillin P300 est un antibiotique contre les agents pathogènes à Gram positif. Il est particulièrement actif dans les infections à streptocoques, staphylocoques non producteurs de  $\beta$ -lactamase. Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida. La pénicilline G est la pénicilline la plus efficace parmi toutes les formes connues. La pénicilline G procaïne a l'avantage d'être absorbée lentement et permet d'obtenir des concentrations thérapeutiques plus durables.

### **Pharmacocinétique**

L'absorption de la benzylpénicilline est bonne après une injection intramusculaire. Les concentrations plasmatiques thérapeutiques sont atteintes en 1—3 heures après l'injection i.m. La demi—vie chez le porc et le mouton se situe entre 2 et 3 h. chez les bovins entre 5 et 6 h.

### **Indications**

Infections aiguës et chroniques à germes sensibles à la pénicilline; rouget du porc, gourme dans sa phase initiale, charbon bactérien (anthrax).

### **Posologie/Mode d'emploi**

Bovins, porc. Mouton	1 ml / 30 kg (corresp. à 10'000 U.I. / kg)
Chien, chat, porcelet (< 10 kg)	0.2 ml / 3 kg (corresp. à 20'000 U.I. / kg)

Administrer Ilcocillin P300 en injection i.m. 1x/jour pendant 5 jours.

### **Limitations d'emploi**

- Contre-indications*: antécédents d'hypersensibilité à la pénicilline ou à la procaïne.
- Précautions* : la pénicilline doit être employée avec précaution lors d'insuffisance rénale.

### **Effets indésirables**

Réactions allergiques (réactions allergiques cutanées, anaphylaxie).

### **Délai d'attente**

Viande: 5 jours, lait: 3 jours.

### **Interactions**

Aucune n'est connue.

### **Remarques particulières**

Conserver au réfrigérateur (2—8°C) et à l'abri de la lumière.

Le flacon doit être utilisé dans les 4 semaines qui suivent le prélèvement de la première dose.

Médicament à usage vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

**Présentation**

Boîtes de 10 flacons à 100 ml  
Swissmedic 52704 (B)  
Code ATCvet QJ01CE09

**Titulaire de l'autorisation**

Biokema SA. Crissier

**Mise à jour de l'information**

Août 2014