

**INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX**

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

**NOTICE D'EMBALLAGE**

Metacam® 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens

**1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60 B, 4057 Bâle

Fabricant responsable de la libération des lots : BI Promeco, S.A. de C.V., Calle Maiz 49, Barrio Xaltocan, Del. Xochimilco C.P. 16090, Mexico, D.F., Mexique

**2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Metacam® 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens

**3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

1 ml contient :

**Substance active :**

Méloxicam 1,5 mg

**Excipients :**

Benzoate de sodium 1,5 mg

Suspension orale.

Suspension orale visqueuse jaunâtre à nuance verte.

**4 INDICATION(S)**

Anti-inflammatoire non stéroïdien pour chiens.

Traitement des phénomènes inflammatoires aigus et chroniques de l'appareil locomoteur, comme par ex. les maladies de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux, les maladies articulaires, les contusions, les entorses, les distorsions, les boiteries et les processus inflammatoires douloureux de l'appareil locomoteur en général.

## **5 CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez chiennes allaitantes ou gestantes.

Ne pas utiliser chez les animaux atteints de troubles cardiaques, hépatiques et de troubles rénaux.

Ne pas utiliser chez les chiens susceptibles de présenter des ulcères gastro-intestinaux ou des saignements.

Ne pas utiliser chez animaux présentant des troubles avérés de la coagulation sanguine.

Ne pas utiliser chez animaux âgés de moins de 6 semaines.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des excipients.

## **6 EFFETS INDÉSIRABLES**

Les effets secondaires typiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens (particulièrement dans les 5 - 14 premiers jours de traitement) comme le manque d'appétit, les vomissements, la diarrhée, les selles goudroneuses, l'apathie et la défaillance rénale ont été très rarement rapportés.

Ces effets secondaires sont passagers dans la plupart des cas et régressent après l'arrêt du traitement. Ils peuvent cependant, en cas d'inattention et dans des cas isolés, être sévères et menacer le pronostic vital.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

## **7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chiens

## **8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Il convient de veiller tout spécialement à l'exactitude du dosage.

Metacam 1,5 mg/ml suspension orale doit être administré dans la nourriture ou directement dans la gueule.

Le premier jour du traitement, une dose unique de 0,2 mg de méloxicam/kg de poids corporel doit être administrée. Alternativement, le traitement peut être initié par le/la vétérinaire avec le médicament Metacam 5 mg/ml solution injectable.

Pour la poursuite du traitement, la posologie suivante doit être utilisée : administration dans la gueule une fois par jour (toutes les 24 heures) de 0,1 mg de méloxicam/kg de poids corporel. Cette posologie doit aussi être utilisée pour le traitement à long terme.

Posologie avec le compte-gouttes du flacon :

Dose initiale : 4 gouttes/kg de poids corporel

Dose d'entretien : 2 gouttes/kg de poids corporel

Posologie avec la seringue doseuse :

La seringue s'adapte sur l'embout compte-gouttes du flacon. Elle est graduée en kg de poids corporel correspondant à la dose d'entretien. Pour le début du traitement le premier jour, le double du volume d'entretien est donc nécessaire.

Alternativement, le traitement peut aussi être initié avec le médicament Metacam 5 mg/ml solution injectable.

La durée du traitement est déterminée en fonction de l'évolution de la maladie. Une amélioration devrait normalement être constatée après 3 - 4 jours de traitement. Si aucune amélioration n'est visible après 10 jours de traitement, il faut arrêter le traitement. Il convient d'éviter les contaminations pendant l'utilisation.


## 9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

### **Bien agiter la suspension avant emploi.**


Il convient de veiller tout spécialement à l'exactitude du dosage.

La suspension peut-être prélevée à l'aide du compte-gouttes (pour de très petites quantités) - 1 goutte contenant 0,05 mg de méloxicam - ou au moyen de la seringue doseuse contenue dans l'étui (voir ci-dessous). La seringue s'adapte au récipient contenant la suspension et est graduée en kg de poids corporel, correspondant au dosage d'entretien (0,1 mg méloxicam / kg de poids corporel). Pour les chiens pesant plus de 35 kg, il est nécessaire d'aspirer la suspension dans la seringue doseuse à deux reprises.


Dosage du volume à administrer au moyen de la seringue :




Bien agiter le flacon!



1. Repousser le piston jusqu'à atteindre approx. Le volume désiré.
2. Adapter le volume de dosage au poids corporel correspondant.



Tourner le récipient et la seringue en sens opposé et retirer la seringue



Mélanger le contenu de la seringue à la nourriture.

**Respecter scrupuleusement les indications du/de la vétérinaire.**

### **10 TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

### 11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 6 mois.

### 12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible : Aucune.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Il faut veiller à un apport d'eau suffisant pendant la durée du traitement.

Des traitements de durée plus longue exigent des contrôles du bilan sanguin par le/la vétérinaire.

Ne pas utiliser chez les animaux déshydratés.

Comme pour tous les antiphlogistiques non-stéroïdiens, le traitement de chiens affaiblis par l'âge comporte un risque accru. Lorsque l'utilisation du produit ne peut être évitée chez de tels animaux, l'administration doit se faire sous surveillance clinique attentive.

Si des effets indésirables devaient apparaître, interrompre le traitement et consulter un vétérinaire.

Ce produit destiné aux chiens ne doit pas être utilisé chez les chats, car il n'est pas adapté à cette espèce animale. Chez les chats, le Metacam 0,5 mg/ml suspension orale doit être utilisé.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Les personnes présentant une hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) doivent éviter tout contact avec la suspension orale.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Ce produit peut causer une irritation oculaire. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Gestation et lactation : Utilisation non recommandée durant la gestation et la lactation (voir rubrique 5).

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions : Ne pas administrer en même temps que d'autres anti-inflammatoires.

Un prétraitement avec des anti-inflammatoires peut avoir comme conséquence l'apparition ou la potentialisation d'effets secondaires. De ce fait, il est nécessaire, avant l'administration de Metacam 1,5 mg/ml suspension orale, d'arrêter le prétraitement au moins 24 heures avant.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles doivent être traitées par votre vétérinaire.

Incompatibilités : Sans objet.

### **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

### **14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

18.10.2023

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Boîte en carton avec flacon de 10 ml, 32 ml ou 100 ml en plastique muni d'un compte-gouttes avec bouchon de sécurité enfant et une seringue-doseuse (graduée en kg de poids corporel).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 52802

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.