

PREVOGENT® ad us. vet.

Suspension in Injektoren

Euterschutz für Kühe während der Trockenzeit

Zusammensetzung

Suspension: Benzylpenicillinum procainum 1 Mio UI, Benzylpenicillinum natricum 500'000 UI, Gentamicinum 100 mg ut Gentamicini sulfas, Paraffinum liquidum, Alchoholes cetylicus et stearylicus, Alchoholes adipis lanae, Vaselinum album.

Conserv.: E 216 15 mg, E 218 35 mg, ad suspensionem pro vase 10 g

Tela cum solutione 3 ml: Benzalkonii chloridum 0.5 mg, Alcohol isopropylicus 0.6 ml, Aqua q. s. ad solutionem pro 1 ml

Eigenschaften / Wirkungen

Prevogent enthält als antimikrobielle Wirkstoffe Penicillin und Gentamicin zur Therapie und Prophylaxe von Mastitiden bei trockengestellten Kühen.

Benzylpenicillin wird bei grampositiven Streptokokken, einschliesslich der B-Streptokokken (Gelber Galt), Penicillin empfindlichen Staphylokokken (insbes. *Staph. aureus*) und Corynebakterien, aber auch bei gramnegativen Keimen, wie Fusobakterien und Pasteurellen, eingesetzt. Das als Procain-Salz vorliegende Benzylpenicillin wird verzögert freigesetzt, wodurch eine Langzeitwirkung entsteht. Gentamicin, ein Aminoglykosidantibiotikum, wirkt durch Beeinflussung der Proteinsynthese bakterizid. Das Wirkspektrum umfasst u. a. gramnegative Bakterien wie *E. coli*, *Proteus* und *Pseudomonas*, aber auch grampositive Bakterien wie *A. pyogenes* und Penicillin resistente Staphylokokken. Aminoglykoside und die Gruppe der β -Lactamantibiotika, zu welchen Benzylpenicillin gehört, wirken in Kombination zum Teil synergistisch.

Indikationen

Therapie und Prophylaxe von Mastitiden bei trockengestellten Kühen

Dosierung / Anwendung

Für jedes Viertel 1 Injektor verwenden. Euter gut ausmelken.

Zitzenkuppen mit Desinfektionstuch gründlich reinigen. Pro Viertel einen Injektor infundieren. Nach der Behandlung nicht mehr melken.

Absetzfristen

Milch: Dieses Präparat ist nur für die Euterbehandlung beim Trockenstellen oder während der Trockenzeit zu verwenden. Bei einer Trockenzeit von weniger als 8 Wochen muss die Milch vor Inverkehrbringen zuerst auf Hemmstofffreiheit untersucht werden.

Essbare Gewebe:

Wird ein Tier während der Trockenzeit geschlachtet, so muss das essbare Gewebe einer Hemmstoffuntersuchung unterzogen werden.

Sonstige Hinweise

Im Kühlschrank bei 2 - 8°C lagern. Nur bis zum mit «EXP.» bezeichneten Datum verwenden. Medikament ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Packungen

4 Injektoren mit 2 Desinfektionstüchern

Zulassungsinhaberin und Herstellerin

Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic 53'354 (A)

ATCvet-Code QJ51RC23

Stand der Information

12.2008