

PREVOGENT® ad us. vet.

Suspension en injecteurs

Protection mammaire pour vaches pendant la période de tarissement

Composition

Suspension: Benzylpenicillinum procainum 1 Mio UI, Benzylpenicillinum natricum 500'000 UI, Gentamicinum 100 mg ut Gentamicini sulfas, Paraffinum liquidum, Alcoholes cetylicus et stearylicus, Alcoholes adipis lanae, Vaselinum album.

Conserv.: E 216 15 mg, E 218 35 mg, ad suspensionem pro vase 10 g

Tela cum solutione 3 ml: Benzalkonii chloridum 0.5 mg, Alcohol isopropylicus 0.6 ml, Aqua q. s. ad solutionem pro 1 ml

Propriétés / Effets

Prevogent contient comme principes actifs de la pénicilline et de la gentamicine pour le traitement et la prévention des mammites pendant la période de tarissement.

La benzylpénicilline agit contre les streptocoques gram positif, y compris les streptocoques B (*S. agalactiae*), les staphylocoques sensibles à la pénicilline (notamment *Staph. aureus*) et les corynébactéries, mais aussi contre des germes gram négatif comme les fusobactéries et les pasteurelles.

La benzylpénicilline, présente sous forme de sel de procaïne, est libérée progressivement, ce qui permet une action de longue durée.

La gentamicine, un antibiotique de la famille des aminoglycosides, possède une action bactéricide en agissant sur la synthèse protéique des bactéries. Son spectre d'action comprend les bactéries gram négatif comme *E. coli*, *Proteus* et *Pseudomonas*, mais aussi les bactéries gram positif comme *A. pyogenes* et les staphylocoques résistants à la pénicilline. Les aminoglycosides et les antibiotiques de la famille des β -lactamines, à laquelle appartient la benzylpénicilline, agissent partiellement de façon synergique lorsqu'ils sont combinés.

Indications

Traitement et prévention des mammites chez les vaches taries

Posologie / Mode d'emploi

Utiliser 1 injecteur par quartier. Traire complètement le pis. Nettoyer soigneusement le bout des trayons avec une serviette désinfectante. Administrer le contenu d'un injecteur dans chaque quartier. Ne plus traire après le traitement.

Délais d'attente

Lait : Cette préparation doit être utilisée uniquement pour le traitement des mamelles lors du tarissement ou pendant la période de tarissement. Si la période de tarissement dure moins de 8 semaines, l'absence complète de substances inhibitrices dans le lait doit être démontrée avant la mise sur le marché.

Tissus comestibles :

Si un animal est abattu pendant la période de tarissement, les tissus comestibles doivent être examinés pour exclure la présence de substances inhibitrices.

Remarques particulières

Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8°C. Utiliser avant la date indiquée avec «EXP.». Tenir hors de portée des enfants.

Présentations

4 injecteurs avec
2 serviettes désinfectantes

Titulaire de l'autorisation et fabricant

Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic 53'354 (A)
ATCvet-Code QJ51RC23

Mise à jour de l'information
12.2008