

PREVOGENT® ad us. vet.

Siringa intramammaria per vacche Benzylpenicillinum, Gentamicinum

Foglietto illustrativo

Informazione per i detentori di animali

Informazione professionale per il personale medico vedi www.tierarzneimittel.ch

1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

Titolare dell'autorizzazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. E. Graeb AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

2. Denominazione del medicamento veterinario

Prevogent ad us. vet., siringa intramammaria per vacche

3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 siringa da 10 g contiene:

Principi attivi:

Benzilpenicillina procaina	1 Mio. U.I.
Benzilpenicillina sodica	500'000 U.I.
Gentamicina (sotto forma di Gentamicinsolfato)	100 mg

Eccipienti:

p-Idrossibenzoato di metile (E 218)	35 mg
p-Idrossibenzoato di propile	15 mg

Sospensione bianca di media consistenza per uso intramammario

4. Indicazioni

Protezione delle mammelle delle vacche durante il periodo di asciutta

Per il trattamento e la prevenzione delle infiammazioni alle mammelle durante il periodo di asciutta delle vacche

5. Controindicazioni

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

Non utilizzare su animali in lattazione.

6. Effetti collaterali: Reazioni allergiche (shock anafilattico, reazioni allergiche cutanee).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario.

7. Specie di destinazione: Vacca

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Utilizzare 1 siringa per ogni quarto.

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Svuotare bene le mammelle. Pulire a fondo i capezzoli con una salviettina disinfettante. Iniettare il contenuto di una siringa in ogni quarto. Dopo il trattamento, non mungere più.

10. Tempi di attesa

Latte:

Questo preparato è riservato al trattamento delle mammelle durante il passaggio all'asciutta o nel periodo di asciutta. In caso di un periodo di asciutta inferiore a 8 settimane, prima della commercializzazione occorre verificare che il latte sia privo di inibitori.

Tessuti commestibili:

Qualora durante il periodo di asciutta un animale venga abbattuto, i tessuti commestibili dovranno essere sottoposti a controllo degli inibitori

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in frigorifero (2 - 8 °C).

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

12. Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il farmaco deve essere utilizzato solo dopo test di sensibilità.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Evitare il contatto diretto con la pelle o le mucose dell'utilizzatore per il rischio di sensibilizzazione.

Le persone con ipersensibilità nota agli ingredienti devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

Gravidanza ed allattamento:

Può essere usato durante la gravidanza.

Questo medicinale veterinario non deve essere somministrato durante la lattazione.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Le penicilline non devono essere combinate con antibiotici ad azione batteriostatica in quanto agiscono solo contro germi in fase di sviluppo.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti, se necessario

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

16.06.2022

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. Altre informazioni

4 siringhe in plastica da 10 g con 2 salviettine disinfettanti (con benzalconio cloruro e alcol isopropilico) in scatola

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 53'354

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.